

雄性成鸟：前额嘴基至后枕部中央冠纹黑色，额部较狭，头顶部宽阔，冠纹两侧赭灰色，渲染金黄色，色调由前向后逐渐变浓，头顶后部至颈部全为金红色；眼先、眼圈下部和耳羽上部黑色，形成宽阔的眼后黑纹伸达颈侧；颊、耳羽下部和颈侧浅赭灰，并稍沾黄色，颊羽缘黑，呈鳞状；颏、喉白色，喉侧黑色羽缘粗著，形成显著的黑色髭纹，并杂有细小的白色点斑；喉部中央羽缘灰黑，呈披针形；下喉部纯白。上体全为亮蓝色；两翅小翼羽黑褐色，外缘稍沾蓝灰色；初级覆羽纯黑褐色；中覆羽、大覆羽和内侧飞羽表面淡灰蓝色，边缘苍淡；肩羽与背同色；外侧初级飞羽6枚，基部具白斑，飞羽余部全为黑褐色，端部浅淡而呈灰褐色；翼下覆羽及腋羽黑褐色，杂有白色羽端。尾上覆羽亮蓝色，羽端中央具亮黑色矢状斑。下体上胸两侧黑白相间的横斑粗著，渲染亮茶黄色和粉蓝色；胸部中央及下体余部满布新月形黑色点斑，渲染淡蓝色，胸部渗淡黄色，两胁和腹部渗淡紫色，下腹部和肛羽、尾下覆羽浅淡，几呈白色；尾下覆羽杂有纤细的淡灰蓝色斑纹。

虹膜棕红色；剥制标本嘴亮黑色，跗蹠和脚趾黄褐色，爪黄色。

量衡度：

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂(1)	109.2	221	25	115	67	47

亚种分化 蓝八色鸫全世界共3亚种，中国仅分布有指名亚种。*P. c. willoughbyi* 分布于老挝中部和越南南部；*P. c. aurantiaca* 分布于泰国东南部。据 Delacour (1931) 记述，*P. c. willoughbyi* 亚种的色彩较指名亚种更鲜艳，胸羽染红色；*P. c. aurantiaca* 亚种头侧、颈羽为黄色。

(1) 指名亚种 *Pitta cyanea cyanea* Blyth

云南南部西双版纳景洪小勐养（偶见）。国外分布于喜马拉雅山东南部不丹、印度东北部阿萨姆东部、缅甸、老挝东北部、泰国北部和西部地区。

形态详见前文。

Pitta cyanea Blyth, 1843, Journ. As. Soc. Bengal 12:1008 (模式产地：缅甸若开)。

生态 栖息于热带雨林中，在林下荫湿处活动觅食。数量十分稀少，迄今仅于1960年3月31日，在云南南部西双版纳小勐养海拔780米处的热带雨林中采得一只雄鸟。

Pitta cyanea Blyth, 1843, Journ. As. Soc. Bengal 12:1008 (模式产地：缅甸若开)。

Pitta cyanea, 郑作新, 1976, 384; Delacour, 1931, 3:23—24; Smythies, 1953, 283; Peters Taylor, 1979, 8:314. *Pitta cyanea cyanea*, Ali et Ripley, 1970, 256—257; Baker, 1926, 3:448—450; Deignan, 1945, 261—262.

4. 蓝翅八色鸫 *Pitta nymphalina* Temminck et Schlegel (图版二：1)

地理分布 河南信阳、安徽霍山、台湾山地（夏候鸟）；广东沿海，福建福州，上海及附近的崇明岛，沙卫山岛（旅鸟）；河北北戴河（1957年6月5日——南开大学生物系）、广西平南、罗香、融水、广东北部龙头山、广州（夏候鸟）；海南岛乐东（旅鸟）。国外分布于日本、