

下的荫湿处活动觅食。不结群,冬季或夏季均见单个或成对活动。脚长而强健,善于奔跑跳跃,频频用脚翻转地上的枯枝落叶,寻找食物。剖验 1 月(1 只)、2 月(1 只)、3 月(1 只)、5 月(1 只)、6 月(1 只)所采的 5 只鸟胃,其中 1979 年 1 月 8 日在盈江龙盆采集的 1 只雌鸟胃内,有鞘翅目锹甲科 (Lucanidae) 及象甲科 (Curculionidae) 昆虫、膜翅目蚂蚁,占胃内食物总量的 75%;种子和果实占 20%;细砂占 5%。另外 4 只胃内食物全是鞘翅目昆虫和蚂蚁等动物性食物。

郑作新等 (1960, 1962) 记录剖验 2、6 月采的 2 只鸟胃,胃内食物见有蚯蚓、甲虫、白蚁和蚂蚁,还有其它昆虫碎片。

6 月 25 日采的雌鸟,见卵巢内有膨大的卵泡。

Hydrornis oatesi Hume, 1873, Str. Feath. 1:477 (模式产地: 缅甸勃固山脉)。


Pitta oatesi, 郑作新, 1976, 386; Baker, 1926, 3: 446—447; Delacour, 1931, 3:22—23; Smythies, 1953, 282; Traylor, 1979, 8:313.

Pitta oatesi oatesi, 昆明动物研究所, 1980, 98; Deignan, 1945, 363—364.

8. 双瓣八色鸫 *Pitta phayrei* (Blyth) (图版二: 5)

地理分布 云南南部西双版纳景洪,勐腊。国外分布于缅甸、泰国、老挝、柬埔寨、越南。

鉴别特征 雄鸟头顶至后颈的中央冠纹黑色,前额及冠纹两侧皮黄色,眉纹近白,各羽均缀以黑色端斑,呈鳞状;后枕部两侧羽毛突出,具皮黄色和黑色相间的横斑,羽端白



分布图 10 双瓣八色鸫 *Pitta phayrei* ●

色,成矛状,形如双辫。上体纯暗棕褐色;下体皮黄色,多少渲染黑色点斑。

形态 (*P. phayrei* 采自云南西双版纳)

雄性成鸟: 头顶至后颈中央冠纹黑色,前额及冠纹两侧皮黄色,眉纹近白,各羽均缀以黑色端斑,呈鳞状;后枕部两侧羽毛突出,具皮黄色和黑色相间的横斑,羽端白色,成矛状,形如双辫;眼先、颊部及耳羽黑色,轴纹皮黄色;眼周淡皮黄色。背部全为栗褐色,羽缘稍暗;肩羽与背同色;初级覆羽黑褐色,其余覆羽棕褐色,具不规则的黑色和淡皮黄色斑纹,初级飞羽黑褐色,基部具显著的淡茶黄色块斑,羽端外翹淡棕褐色;次级飞羽表面及尾羽棕褐色。颞纹皮黄,羽端缘以黑色;颏、喉白色,羽缘黑色,羽轴延长成须状;下体余部棕茶黄色,下喉至胸部及两胁较深浓,多少具大小不一的黑色点斑;腹部中央浅淡,几成纯色,肛羽粉红色;尾下覆羽桔红色。翅下覆羽及腋羽淡黑褐色,腋羽具茶黄色羽端。

虹膜棕红褐色;嘴峰黑褐,上嘴尖端略向下弯曲,覆盖下嘴;跗蹠、脚淡肉色。

雌性成鸟: 头部中央及上体均为暗栗褐色,头部尤其深浓;眼先、颊及耳羽亦呈栗褐色,轴纹苍淡,羽缘黑褐色;下体棕茶黄色较雄鸟浅淡,胸部及两胁的黑斑较多;尾下覆羽桔红色浅淡,余部与雄鸟相似。

量衡度:

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂(2)	90,100	216,242	29,30	99,100	50,56	32,32
♀(1)	—	230	27	101	55	31

分类讨论 双辫八色鸫 (*phayrei*) 归列为哪一个属的分类问题,历来学者所持意见不一,如 Blyth (1862), Sclater (1888), Baker (1926), Delacour (1931) 和郑作新 (1976) 等均将双辫八色鸫 (*phayrei*) 列为 *Anthocincla* 属的单型种。此外, Smythies (1953)、Deignan (1963)、Clements (1974)、Gruson (1976)、Traylor (1979) 将 *phayrei* 归列为八色鸫属 (*Pitta*) 的一个种。据 Sclater (1888)、Baker (1926) 记述 *Anthocincla* 与 *Pitta* 的区别,仅在于前者具较长的羽冠和稍细长的嘴,翅短圆,跗蹠亦较短。对比分布于中国的几种八色鸫,双辫八色鸫的上列特征与它们的区别不甚显著。故按 Traylor (1979) 和其他一些学者的意见,将 *phayrei* 归列为 *Pitta* 的一个种,并将 *Anthocincla phayrei obscura* Delacour 作为 *Pitta phayrei* (Blyth) 的同物异名。

生态 该鸟栖息于热带雨林中,采集地海拔 610—750 米。在竹林和灌丛间活动觅食。据郑作新等 (1958) 报道 1 只雌性成鸟,“此鸟在西双版纳小勐养 (22.07° N; 100.90° E.) 的井伞乡 (位于勐养西北约 20 公里,海拔 750 米) 于 1956 年 3 月 20 日猎得。射获前,见其在溪流附近山坡上的竹林和小树间活动,用其有力的脚爪和嘴翻拨地面上的枯叶,觅寻食物。它们是经常在地面上活动的,由于其羽色和枯叶很相似,以及善于跳跃的缘故,很容易躲着人们的视线,而出现于另一地方,仍进行着翻拨枯叶找寻食物的活动。”

Anthocincla phayrei Blyth, 1862, Journ. As. Soc. Bengal: 31:343(模式产地: 缅甸 Tounghoo)。

Anthocichla phayrei obscura Delacour, 1927, Bull. Brit. Ornith. Club, 47, p. 155 (模式产地: 越南 Lakes Babé)。

Anthocincla phayrei, 郑作新, 1976, 386; Baker, 1926, 3:442—443; Delacour, 1931, 3: 28—29; Smythies, 1953, 281—282.

Anthocincla phayrei phayrei, Deignan, 1945, 264—265.

Pitta phayrei, Traylor, 1979, 8: 321.