

分布图 61 黑头鹎 *Pycnonotus atriceps atriceps* ●

亮,羽基深灰,羽片中部黑色,若杂斑状;尾上覆羽鲜橄榄黄,特形发达,延伸超达尾长之半;尾羽基部约三分之二与尾上覆羽同色,先端转呈黑色,尾端深黄;中央尾羽黄端较窄,外侧尾羽渐形宽阔;大覆羽、飞羽概黑褐;除外侧 2—3 枚飞羽外,其余初级飞羽和大覆羽均狭缘以橄榄绿黄色,于次级飞羽渐宽,至三级飞羽外翮和内翮先端纯为橄榄绿黄色;次级覆羽与背同色;胸橄榄黄;腹部转呈深黄色;尾下覆羽甚发达,亦为深黄色,与尾上覆羽一样达于尾羽一半以上;翼缘橄榄绿黄;翼下覆羽黄白色。

虹膜浅蓝;嘴近黑色;脚和爪暗褐色。

量衡度:

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂ (2)	25,38	172,189	13.5,15.5	80,81	76.5,78	15,15.5

分类讨论 黑头鹎曾以其罕见的特形丰满而长的尾上覆羽和尾下覆羽为特征立为 *Microtarsus*。后因其嘴形中等,跗蹠短,羽衣色泽等与 *Pycnonotus* 均有相似之处而归隶该属。

此鸟有两个色型。其一,羽衣呈橄榄黄,而头、喉及胸黑色,尾羽先端具一黑色横斑;其二,下体缺乏黄色素而呈蓝灰色,其它橄榄色亦代以苍灰色,尾端斑白色 (Smythies, 1953; Ali *et al.*, 1971)。

亚种分化 黑头鹎有 5 个亚种,见于中国的为指名亚种。

(1) 指名亚种 *Pycnonotus atriceps atriceps* (Temminck)

云南西双版纳勐腊 (2 月)。国外分布于印度东北部阿萨姆,孟加拉国,中南半岛,印度尼西亚和菲律宾群岛的巴拉望岛。