(1) 云南亚种 *Pycnonotus jocosus monticola* (McClelland)

西藏东南部墨脱；云南西部盈江、潞西、保山、临沧、永德、孟定、耿马、双江，西南部沧源、西盟、孟连，西部景东，南部思茅、西双版纳、江城、绿春、金平（留鸟）；西双版纳一带有与 *jocosus* 的居间类型。国外见于锡金，不丹，印度东北部阿萨姆，缅甸北部。

形态见种的描述。

Ixos monticola McClelland, 1839, Proc. Zool. Soc. London 7:160（模式产地：印度阿萨姆的 Khasi *et* Jaintia Hill Districts, Surma Valley *et* Hill Division）。

(2) 指名亚种 *Pycnonotus jocosus jocosus* (Linnaeus)

云南东南部河口；贵州西南部兴仁、兴义、安龙，南部册亨、望谟、罗甸；广西西南部睦边、靖西、龙津、宁明、崇左、上思、邕宁、瑶山、东北部乐业，广东北部桂头和广州一带（留鸟）；云南东南部西畴和贵州西南部有与 *monticola* 的居间类型；尚见于香港地区。国外见于澳洲新南威尔士(引进种)。

与 *monticola* 相较，上体淡而沾棕，下体两侧富于棕色，并向下体中央侵伸；*monticola* 下体两侧缀淡烟棕，且仅限于胁部。

虹膜褐色；嘴和脚均黑。

量衡度：

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂(16)	33.1 (29—36)	195.6 (187—210)	13.0 (11—14)	87.7 (85.5—91)	93.7 (87.5—98.5)	22.0 (20.5—23.0)
♀♀(13)	33.5 (28—36)	188.7 (178—204)	13.6 (13—14.5)	84.5 (81—92)	90.3 (86.5—98)	21.6 (20.5—22.5)

Lanius jocosus Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, 1:95(模式产地：广东广州)。

生态　栖息于海拔约 1,500 米以下的雨林、季雨林，也多见于坝区村寨附近的林缘和庭园，或江边丛林和灌木丛，如野蔷薇、石楠（*Photinia* sp.）、棠李（*Pyrus pushia*）、飞机草等，未见于森林深部。常一、二十只或二、三十只成群，有时与红臀鹎、黄臀鹎混群觅食于乔木或果树冠部和中层。据郑作新等(1963)，1958 年 12 月在广西靖西的一个山村曾见近 200 只红耳鹎群集在一棵枫树（*Lidambar formosana*）上，及至见人行近，飞离至山腰灌丛鸣叫不已。性活泼善鸣，于晨曦即成群鸣叫觅食于叶丛花果间，忙碌终日。1957 年 2 月 17—19 日在云南思茅进行了三天的观察。据记录，该鸟在日出之前约 6 点钟即开始活动，6 点 20 分开始鸣叫；傍晚约 18 点 56 分才栖息于树上，日落后 3 分钟左右停止鸣叫，每日活动时间约超过 11 小时。鸣声宏亮激昂，略具韵律，急遽重复不已；有时鸣声轻缓而平稳，似“mow-joi——see, chik——ji——sik——chai, chik——ji——sik——chai, ……”。

杂食性，在野外常见它们啄食棠李、石楠、榕果、蓝靛（*Indigofera tinctoria*），摄食花果树上的昆虫，并见它们停息在电话线上，掠捕飞虫。据剖验 1 月（7 个）、2 月（4 个）、4 月（11 个）、5 月（3 个）、6 月（11 个）、7 月（3 个）、8 月（3 个）和 9 月（5 个）共 47 只采自云