

观察标本：四川（1♂、1♀）、广西（1♀）。

国内分布于四川马边，广西瑶山（罕见留鸟）。

(2) 海南亚种 *Cissa hypoleuca katsumatae* Rothschild

Cissa katsumatae Rothschild, 1903, Bull. Brit. Cl. 14, p. 9 (模式产地：海南岛五指山)。

形态详见种的描述。

国内仅分布于海南岛（留鸟）。

生态 见于山地的原始和次生林中，常单个在小溪旁、地面或灌丛小枝上跳跃和觅食。

经济意义 本种为鸦科中羽色艳丽的一个物种，为大自然增加了色彩，对农、林业又无危害，不失为一好的物种，应保护。

地理分布 国内分布于四川，广西和海南。国外分布于越南，泰国和文莱。

5. 绿鹊 *Cissa chinensis* (Boddaert) (图版 I 图3)

英文名：Green Magpie.

Coracias chinensis Boddaert, 1783, Tabl. Pl. enlum. Hist. Nat. 38 (模式产地：云南，实属错误，应为泰国西部，据 Robison et Kloss)。

鉴别特征 体羽绿色，翅红色以及有醒目的黑色贯眼纹。

形态 (据采自云南勐腊的指名亚种标本)

雄性成鸟：头、颈淡黄绿色；上体亮绿；自眼先经眼直到后颈并在颈项相遇形成一黑色带斑；颊、颈侧和下体黄绿沾蓝；尾羽绿色，中央尾羽末端白色，两侧尾羽亦具白端并具较宽的黑色次端斑；小覆羽绿色，其他覆羽栗红色；初级飞羽内翮褐色、外翮红色，内侧次级飞羽末端有一黑色横斑和淡蓝的先端。

雌性成鸟：与雄鸟形态相似。

虹膜绯红色，刚采标本其肉质的眼缘及其上的小肉突为亮黄红色非常显明，但标本贮存过久则不显；嘴、跗蹠和爪橘红色。

量衡度：

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂ (6)	138.9	373.8	33.5	149.3	203.3	44.5
	(120—150)	(336—395)	(31.5—36)	(146—157)	(178—215)	(42—47.5)
♀♀ (11)	132.3	371.2	33.1	147	187.9	42.2
	(120—160)	(330—395)	(30.5—36)	(137—180)	(156—211)	(39—47.5)

观察标本：云南（勐腊2♂♂、4♀♀；勐仑3♂♂、2♀♀；勐连1♀；勐养1♀；绿春1♀；艺莽1♂；宗勒1♀；橄榄坝1♀）。

亚种分化 本种分化有5个亚种；中国有一个亚种。