

图 114 禽鼻乌鸦 *Corvus frugilegus*

量度:

性别	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂(3)	456	45.2, 50, 46	298, 327, 327	173, 203, 192	51, 60.5, 53
♀♀(6)	—	44.1 (40—48)	295.7 (287—305)	176.3 (165—185)	52.9 (50—55)

亚种分化 计有 2 个亚种，中国均产。

亚种检索

- 成鸟眼先与额均裸出，头顶具淡紫蓝光泽 指名亚种 *C. f. frugilegus*
 成鸟眼先与额均被羽，头顶与背均黑色，不具淡蓝色光泽 普通亚种 *C. f. pastinator*

(1) 指名亚种 *Corvus frugilegus frugilegus* Linnaeus

Corvus frugilegus Linnaeus 1758, Syst. Nat., ed. 10, 1: 105 (模式产地：瑞典).

Corvus frugilegus tschusii Hartert, 1910, Vog. Pal. Faun. 1: 14 (模式产地：克什米尔 Gilgit).

Trypanocorax frugilegus ultimus Sushkin, 1925, List. Distr. Birds, Russian Altai, p. 65 (模式产地：西西伯利亚).

与普通亚种相较，眼先和前额在成鸟是裸露的，与嘴角相同，头顶和额具淡紫蓝光泽，这是与普通亚种相区别之处。

量衡度:

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂(1)	—	—	51	330	187	55.5
幼	362	420	50	305	174	54

分布于新疆西北部塔城、西部喀什、伊宁（旅鸟、冬候鸟、少数繁殖鸟）。国外分布于西欧，中欧，西亚，南亚和蒙古等地区。




图 115 秃鼻乌鸦 *Corvus frugilegus* 的分布图

○ *C. f. frugilegus*; ● *C. f. pastinator*

(2) 普通亚种 *Corvus frugilegus pastinator* Gould

Corvus pastinator Gould, 1845, Proc. Zool. Soc. London, p. 1 (模式产地：中国浙江舟山).

Trypanocorax pastinator centralis Tugarinov, 1929, Ann. Mus. Zool. Acad. Sci. (Urss: Leningrad)29(1928), p. 267 (模式产地：蒙古北部).

形态及量衡度详见种的记述。

分布于东北西北部呼伦贝尔盟牙克石、东北部爱珲、中部哈尔滨、南部旅顺、西南部朝阳和赤峰，河北，山西，河南，山东，内蒙古伊克昭盟，西至甘肃兰州、祁连山，青海西宁，四川北部松潘及马尔康、中部峨眉山，南抵长江中下游以至浙江（留鸟、旅鸟）；福建，广东，广西（冬候鸟）；台湾（迷鸟），海南岛。国外分布于蒙古北部与指名亚种相遇；朝鲜。

生态 栖息于平原、丘陵、低山区的常见鸟类，中、高山则偶见；多三五成小群在农田、道旁、垃圾堆和屠宰场附近觅食，食饱后飞往河边浅水处饮水或停息在附近的杨、