

形态 (据采自云南盈江的云南亚种)

成鸟：前额和眼上眉纹墨黑色，两颊其余部分和喉煤黑色到煤褐色，至耳羽逐渐变为亮淡灰褐色；颈侧和胸部淡褐灰至腹部逐渐变为淡灰。尾下覆羽鲜亮的淡黄栗；头顶和颈项深银灰，至翕部和背部逐渐发红变为稍发红的土褐色；下腰和尾上覆羽淡灰到淡灰白；翅亮黑具白色块斑位于翅基部，是初级飞羽的内外翮形成的，当翅折合时是白色块斑，但当展翅时则为一横斑。外侧尾羽黑色，两枚中央尾羽淡蓝灰色，具黑色端斑。

虹膜淡红褐色；嘴黑色；跗蹠、趾黑色或淡褐黑色。

雌雄同形。幼鸟较淡，灰羽部分具赤褐色尖端。

量衡度：

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂ (32)	99.1	367.8	28.9	141	204	28.6
	(90—110)	(330—390)	(26—31.1)	(133—148)	(161—232)	(26—32)
♀♀ (16)	96.6	369.5	27.9	139.2	207	28.4
	(85—105)	(348—392)	(26.5—30)	(131—149)	(190—222)	(27—31)

地理分布 国内分布于东部，西部，台湾，海南。国外分布于尼泊尔，不丹，印度东部和安达曼群岛，缅甸，泰国，老挝，文莱。

亚种检索

- 1. 中央尾羽大部灰色 2
- 中央尾羽大部或全部黑色 3
- 2. 腹部淡灰；尾长超过200mm 云南亚种 *D. f. himalayensis*
- 腹部淡褐；尾长不及200mm 指名亚种 *D. f. formosae*
- 3. 下背较暗褐；中央尾羽靠基部的1/2部分为深灰，余为黑色 四川亚种 *D. f. sapiens*
- 下背黄褐；中央尾羽全为黑色 4
- 4. 体形较大，翅长♂♂ (14) 144 (141—151) mm, ♀♀ (8) 143.6 (136—150) mm 华南亚种 *D. f. sinica*
- 体形较小，翅长♂♂ (10) 129 (124—138) mm, ♀♀ (13) 129.9 (121—139) mm 海南亚种 *D. f. insulae*

(1) 指名亚种 *Dendrocitta formosae formosae* Swinhoe

Dendrocitta formosae Swinhoe, 1863, Ibis 5: 387 (模式产地：台湾)。

本亚种与其邻近的福建、江苏、浙江等省所产的华南亚种 (*D. f. insulae*) 相似，但上体稍淡，中央尾羽基部或多或少稍渲染灰色。

量衡度:

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂			23	139	162	31

仅分布于我国台湾。

(2) 云南亚种 *Dendrocitta formosae himalayensis* Blyth

Dendrocitta himalayensis Blyth, 1865, Ibis (2) 1: 45 (模式产地: 锡金).

形态与量衡度详见种的描述。

分布于云南西部腾冲、湾甸和太平铺、中部景东、南部西双版纳 (留鸟)。

观察标本: 腾冲3♂♂, 景东8♂♂、1♀, 沧源2♂♂, 江城3♂♂、1♀, 盈江1♂, 潞西2♂♂、5♀♀, 思茅1♂、2♀♀, 镇康1♂, 勐腊1♂, 勐养3♂♂、2♀♀, 勐连3♂♂、2♀♀, 勐海2♂♂, 勐定1♂、1♀, 勐混1♂, 勐仑1♀, 勐戛1♀。

(3) 四川亚种 *Dendrocitta formosae sapiens* (Deignan)

Crypsirina formosae sapiens Deignan, 1955, Bull. Brit. Orn. Cl. 75 (9): 130 (模式产地: 四川峨眉山)。

本亚种与华南亚种 *D. f. sinica* 相较, 后者中央尾羽黑色, 下背黄褐, 而本亚种中央尾羽基部约占尾长1/2处是深灰, 余为黑色, 下背较暗褐。

量衡度:

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂ (6)	105,104	331,328	29.7	147.2	181.2	29.9
			(27.8—30.5)	(141—153)	(170—189)	(29—31)
♀♀ (4)	—	—	29,30,	131,145,	164,185,	30,30,
			29.2,29.2	147,146.5	169,179	30,31

分布在四川峨眉山、雅安一带, 北抵马尔康 (留鸟)。

观察标本: 四川峨眉山6♂♂、4♀♀。

(4) 华南亚种 *Dendrocitta formosae sinica* Stresemann

Dendrocitta formosae sinica Stresemann, 1913, Orn. Monatsb. 21: 9 (模式产地: 福建青风岭)。

Dendrocitta formosae schistacea Stresemann, 1929, Orn. Monatsb. 37: 139 (模式产地: 广西瑶山)。

本亚种的体色一般较暗, 致使近似于纯白的下腰部和尾上覆羽就特别醒目, 尾羽全黑。