

量衡度:

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂			23	139	162	31

仅分布于我国台湾。

(2) 云南亚种 *Dendrocitta formosae himalayensis* Blyth

Dendrocitta himalayensis Blyth, 1865, Ibis (2) 1: 45 (模式产地: 锡金).

形态与量衡度详见种的描述。

分布于云南西部腾冲、湾甸和太平铺、中部景东、南部西双版纳 (留鸟)。

观察标本: 腾冲3♂♂, 景东8♂♂、1♀, 沧源2♂♂, 江城3♂♂、1♀, 盈江1♂, 潞西2♂♂、5♀♀, 思茅1♂、2♀♀, 镇康1♂, 勐腊1♂, 勐养3♂♂、2♀♀, 勐连3♂♂、2♀♀, 勐海2♂♂, 勐定1♂、1♀, 勐混1♂, 勐仑1♀, 勐戛1♀。

(3) 四川亚种 *Dendrocitta formosae sapiens* (Deignan)

Crypsirina formosae sapiens Deignan, 1955, Bull. Brit. Orn. Cl. 75 (9): 130 (模式产地: 四川峨眉山)。

本亚种与华南亚种 *D. f. sinica* 相较, 后者中央尾羽黑色, 下背黄褐, 而本亚种中央尾羽基部约占尾长1/2处是深灰, 余为黑色, 下背较暗褐。

量衡度:

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂ (6)	105,104	331,328	29.7	147.2	181.2	29.9
			(27.8—30.5)	(141—153)	(170—189)	(29—31)
♀♀ (4)	—	—	29,30,	131,145,	164,185,	30,30,
			29.2,29.2	147,146.5	169,179	30,31

分布在四川峨眉山、雅安一带, 北抵马尔康 (留鸟)。

观察标本: 四川峨眉山6♂♂、4♀♀。

(4) 华南亚种 *Dendrocitta formosae sinica* Stresemann

Dendrocitta formosae sinica Stresemann, 1913, Orn. Monatsb. 21: 9 (模式产地: 福建青风岭)。

Dendrocitta formosae schistacea Stresemann, 1929, Orn. Monatsb. 37: 139 (模式产地: 广西瑶山)。

本亚种的体色一般较暗, 致使近似于纯白的下腰部和尾上覆羽就特别醒目, 尾羽全黑。