

成鸟：头部、颈项、两颊、颈侧、颞、喉至上胸灰棕黑色，嘴基和眼周最暗；肩、背淡暗棕色；尾上覆羽浅棕黄色；尾羽淡蓝灰色，尾基部最深，向尾稍逐渐变浅，尾端则具宽的（4—5cm）黑色端斑，外侧尾羽与中央尾羽相同但黑色端斑相应变大，最外侧尾羽黑色端几占一半尾羽的长度；下胸、腹部和体侧棕黄色；尾下覆羽淡棕黄色；翅上覆羽淡灰白；三枚最内侧的次级飞羽外翮灰色，其余次级飞羽外翮灰色稍缩小，飞羽余部概黑色。

虹膜暗褐；嘴、跗蹠、趾为暗黑色。

量衡度：

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂	96	430	29	146	249	35

地理分布 国内仅分布于云南盈江。国外分布于喜马拉雅山南坡北部与东部，印度，缅甸，泰国，越南。

亚种分化 共计有8个亚种，中国分布1个亚种。

(1) 云南亚种 *Dendrocitta vagabunda kinneari* Baker

Dendrocitta rufa kinneari Baker, 1922, Fauna Brit. India, Birds, 2ed. 1, p. 51 (模式产地：缅甸南部 Toungoo)。

形态、量衡度及分布详见种的描述。

生态 采时见单个活动于次生竹林内。胃内容物为野果，并有少量昆虫碎片。

13. 黑额树鹊 *Dendrocitta frontalis* (McClelland)

英文名：Black-browed Tree Pie.

Dendrocitta frontalis McClelland, 1839, Proc. Zool. Soc. London: 163 (模式产地：印度阿萨姆)。

Dendrocitta frontalis kurodae Delacour, 1927, Bull. Nrit. Orn. Cl., 47, p. 165 (模式产地：越南北部 Backan)。

鉴别特征 头部黑色；背、上腹灰色；腰和下腹、尾下覆羽、腿褐栗色。

形态 (据 Goodwin, 1976)。前额、头顶、颊部、喉和上胸黑色；颈项、颈、上翕部和胸银灰到亮淡蓝灰，与黑色头部间有一青白色的分界线，尤其是颈侧的分界线常是白色；翕部（灰色的上翕部以下）和背为暗茶褐或茶栗色、稍沾橄榄色，然后逐渐变为亮淡棕茶色的腰部和栗色的尾上覆羽；大覆羽、初级飞羽、次级飞羽和尾羽黑色；胫羽灰色沾茶色。

虹膜红褐或暗红；嘴、腿和趾黑色。

幼鸟较乌暗，灰色羽大多具浅褐尖端。