

近下腹处呈灰白色。本亚种与 *sinensis* 和 *taivanus* 较近似，但本亚种鼻须黑端不著或无黑端，而别于后二者鼻须具显著的黑端，且后二者前额羽亦具黑端缘而不同于本亚种。

**量衡度：**

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂ (2)	114,128	290,280	28,25.5	165,164	149,153	40.5,38.5
♀ (1)	120	185	26	170	155	40

国内分布于西藏波密、察隅、易贡、排龙、西藏南部及昌都地区西南部。国外见于不丹，锡金，孟加拉国，印度等。

**(5) 云南亚种 *Garrulus glandarius leucotis* Hume**

*Garrulus leucotis* Hume, 1874, Proc. As. Soc. Bengal 1: 106 (未举模式采集地)。

*Garrulus leucotis* Hume, 1874, Str. Feath. 2; 443 (模式产地：缅甸：Kan-karyit, tenasserim)。

**形态** 雌雄体色相似。额白色，具黑褐羽干纹；头顶至后颈黑色；肩淡棕红色；背和腰橄榄棕褐色；尾上覆羽白色。翅初级飞羽3—8枚外翮白色，翅斑同其他亚种。眼先、耳羽、眉纹、颈侧、颞、喉及尾下覆羽白色；下体余部棕红、胸沾灰褐。

幼鸟：头部黑色仅限头顶；后颈至下背棕褐色；肩淡棕褐、羽端棕红。下体比成鸟淡。本亚种额白色、头顶至后颈黑色而与国内分布的其他亚种都不同。

**量衡度：**

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂ (3)	160,160,	342,342,	30,31.5,	178,180,	146,146,	42,42.5,
	170	312	31.5	183	149	42
♀♀ (4)	—, —,	325,317,	31.5,32.5,	177,183,	144,146,	42.5,44,
	—,160	335,330	30,31	181,178	148,149	41,41
幼♂ (1)	—	310	27	167	127	40

国内分布于云南西双版纳、思茅、景洪、勐海等地。国外见于锡金，印度，缅甸等国家和地区。

**(6) 普通亚种 *Garrulus glandarius sinensis* Swinhoe**

*Garrulus sinensis* Swinhoe, 1863, Proc. Zool. Soc. London 304 (nom. und.): *ibid.*, 1871: 381:

(模式产地：华南，西抵四川)。

*Garrulus rufescens* Reichenow, 1897, Orn, Monatsb. 5: 123 (模式产地：云南北部)。

*Garrulus glandarius rubrosus* Kleiner, 1940, Aquila 42—45: 185 (模式产地：湖北汉口)。

*Garrulus glandarius minkoensis* Kleiner, 1940, Aquila 42—45 186 (模式产地：四川灌县附近)。

形态及量衡度见种的记述。