

明显，约与额带同宽；背羽及尾羽棕褐，尾羽上有多条暗色隐横带。颈、喉白色，胸以下淡锈棕色。

雌鸟背羽比雄鸟发暗，额带不明显，眉纹淡黄；颈、喉染污黄，胸以下不若雄鸟鲜亮并满布鳞纹。

量衡度：

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂(41)	32.2 (24—44)	188.5 (173—203)	14.2 (11—16)	86.6 (81—94)	85.1 (75—94)	24.9 (23—29)
♀♀(31)	31.5 (23—40)	184.8 (165—205)	13.8 (11—15)	84.9 (82—89)	83.2 (78—92)	25 (20—28)

国内分布于黑龙江，吉林，辽宁，内蒙古，甘肃，青海，陕西，山西，河北，河南，山东，四川，湖北，江苏，福建，贵州，广东，广西（旅鸟）；云南，海南，台湾（旅鸟、冬候鸟）。

(2) 东北亚种 *Lanius cristatus confusus* Stegmann

Lanius cristatus confusus Stegmann, 1929, Journ. f. Orn. 77:248 (模式产地：黑龙江上游)。

与指名亚种相比较，头顶及背羽更显暗褐，额带不明显，有细窄的不明显的白眉；下体略染淡棕，近于白色。雌鸟胸、胁有鳞纹，眼先及过眼纹、耳羽为黑褐色。

量衡度：

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂(8)	32.3 (29—36)	195.3 (185—200)	14.9 (14—16)	86.4 (85—88)	84.3 (78—88)	25.3 (24—26)
♀♀(8)	33.4 (27—38)	187.3 (153—207)	15.1 (13—16)	85.4 (83—88)	85.7 (84—90)	25.6 (24—26)

国内分布于黑龙江省大、小兴安岭及黑龙江流域、乌苏里江流域，内蒙古海拉尔（繁殖鸟、旅鸟），辽宁，河北（旅鸟），海南（冬候鸟）。国外分布于俄罗斯西伯利亚、乌苏里斯克（双城子）（繁殖鸟），泰国及马来半岛（冬候鸟）。

(3) 普通亚种 *Lanius cristatus lucionensis* Linnaeus

Lanius lucionensis Linnaeus, 1766, Syst. Nat., ed. 12, 1:135 (菲律宾：吕宋)。

形态详见种的描述。

国内分布于吉林省长白山，辽宁，河北，山西，河南，山东，陕西，甘肃，四川，云南，贵州，长江流域各省以至福建，广东北部（繁殖鸟、旅鸟）；海南（冬候鸟）。国外分布于菲律宾，加里曼丹岛（冬候鸟）。

(4) 日本亚种 *Lanius cristatus superciliosus* Latham

Lanius superciliosus Latham, 1808, Ind. Orn. Suppl. 20 (模式产地：印度尼西亚爪哇的