

量衡度:

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂ (3)	62	241	17	112.6	106	31.5
		(240—242)	(17—17)	(112—114)	(105—107)	(31—32)

注: 1975年8月4—23日, 采于新疆巴楚戈壁滩红柳林中, 为国内首次采集记录, 标本藏于北京师范大学。

国内分布于新疆喀什 (旅鸟、冬候鸟)。国外分布于欧洲东南部, 从保加利亚、罗马尼亚南部经乌克兰到乌拉尔山, 西伯利亚西部至阿尔泰山北部 (繁殖鸟、旅鸟), 高加索, 伊朗 (冬候鸟)。

(5) 天山亚种 *Lanius excubitor leucopterus* Severtzov

Lanius excubitor var. *leucoptera* Severtzov, 1875, Str. Feath. 3: 430 (模式产地: 中亚: Upper Naryn Riv., Russian Turkestan)。

本亚种国内未藏标本。据郑作新 (1964) 应为上体淡灰, 下体较白, 腰和尾上覆羽白色。Dementiev (1954) 认为它是新疆亚种 *homeyeri* 的同物异名。

国内分布于新疆天山 (旅鸟、冬候鸟)。国外分布于西伯利亚西部 (夏候鸟); 伊朗 (旅鸟、冬候鸟)。

(6) 宁夏亚种 *Lanius excubitor pallidirostris* Cassin

Lanius pallidirostris Cassin, 1852, Proc. Acad. Nat. Soc. Philadelphia 5: 244 (模式产地: 非洲东部)。

Lanius grimmi Bogdanow, 1881, Wurg. Russ. Faun., in Faun. Zapiski Imp. Nauk. 39: 151 (模式产地: 原苏联: Atrek-Fluss an der Perisch-transkaspischen Grenze, Ust-Urta. Taschkent, Alaschan, Ostl. bis Amu Darja. Syr Darja und Buchara)。

本亚种前额基白色并经头侧与宽的白眉纹相连; 眼先、过眼及耳羽黑色; 上体较 *homeyeri* 发灰色, 棕色调较少; 下体近于纯白。

量衡度: (据王香亭, 1991)

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂ (1)		250	16	114	123	25
♀ (1)		247	17	116	120	25

国内分布于宁夏贺兰山, 甘肃西北部河西走廊 (夏候鸟), 新疆喀什、罗布泊 (旅鸟)。国外分布于阿斯特拉罕、伏尔加、西伯利亚西部, 土耳其斯坦 (夏候鸟、旅鸟); 阿富汗, 非洲东北部 (冬候鸟)。

生态 灰伯劳栖息于从平原到山地的疏林或林间空地附近, 许多种群适应于在荒漠及半荒漠地带的疏林中生活。性凶猛, 捕食昆虫及小型脊椎动物、小鸟、鼠等, 在新疆巴