

山 Tschuja 附近)。

形态 详见种的描述。

国内分布于辽宁省辽阳, 内蒙古赤峰, 河北北部, 甘肃西北部(旅鸟、冬候鸟)。国外分布于俄罗斯阿尔泰中部, 蒙古西北(夏候鸟、旅鸟); 日本(迷鸟)。

(2) 北方亚种 *Lanius excubitor sibiricus* Bogdanov

Lanius borealis sibiricus Bogdanov, 1881, Zapiski Tmp. Akad Nauk. 39: 102 (模式产地: 西伯利亚 Tschuktschen-Halbinsel, Ochotsk, Chanka)。

本亚种与东北亚种相比较, 头部及上体均发淡灰色, 白眉鲜明; 肩及尾上覆羽均有更宽的淡灰白端缘; 颈、肩染以赭色。下体浅灰, 胸部染棕, 有稀疏不明显的鳞纹。

量衡度:

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂ (4)	61.1	247.3	17.5	117.3	116.5	26
	(59—65)	(235—264)	(17—18)	(116—118)	(110—124)	(25—27)
♀♀ (8)	63	254	17.5	114.3	115.1	25.9
	(54—66)	(245—263)	(16—19)	(113—118)	(109—119)	(24—27)

国内分布于黑龙江省大、小兴安岭, 吉林, 三江平原及松嫩平原, 内蒙古呼伦贝尔盟, 辽宁, 河北(旅鸟、冬候鸟)。国外分布于西伯利亚东部、贝加尔湖, 蒙古(夏候鸟、旅鸟)以及朝鲜半岛(旅鸟、冬候鸟)。

(3) 准噶尔亚种 *Lanius excubitor funereus* Menzbier

Lanius funereus Menzbier, 1894, Ibis (6) 6: 378 (模式产地: 中亚天山山脉 Ulugschat, Kuldscha)。

本亚种迄今国内未藏标本。据 Dementiev (1954), 与东北亚种的羽色十分相似, 以致有人认为是后者的个体变异。一般比东北亚种羽色更暗, 成鸟的上体缺乏赭色而更显暗灰; 下体发褐并有黑褐鳞纹; 翅斑较小。

国内分布于新疆准噶尔和天山(夏候鸟)。国外分布于土耳其斯坦(留鸟)。

(4) 新疆亚种 *Lanius excubitor homeyeri* Cabanis

Lanius homeyeri Cabanis, 1873, Journ. Orn. 21: 75 (模式产地: 中亚 Karaschat, Taschkent)。

Lanius przewalskii Bogdanov, 1881, Zapiski Imp. Akad. Nauk., 39: 147 (模式产地: 中亚 Karaschat, Taschkent)。

本亚种上体淡棕灰, 有白色前额、眼先及宽眉纹; 肩羽沾白; 初级飞羽基部白斑发达, 次级飞羽基部亦有白斑, 因而在翅上形成双翅斑; 下体近纯白色, 胸、胁略染淡粉棕。