

量衡度：

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂(18)	76.2 (72—79)	258.9 (246—280)	26.3 (24—28)	145 (140—150)	105.8 (97—112)	23.3 (22—26)
♀♀(14)	72.9 (69—80)	251.6 (237—268)	25.5 (25—26)	140.6 (135—145)	104.1 (98—111)	23 (21—26)

国内分布于云南河口，海南（留鸟）。国外分布于老挝，越南（留鸟、冬候鸟）。

(3) 台湾亚种 *Oriolus traillii ardens* (Swinhoe)

Psaropholus ardens Swinhoe, 1862, Ibis 4: 363 (模式产地：台湾)。

本亚种雄鸟背、腹羽为朱红色；尾羽较体羽色稍淡，最外侧一对尾羽外翈具淡黑褐色斑。雌鸟背羽棕栗杂有红斑；颈、喉黑褐具淡棕色细羽缘；胸、腹白色具黑褐色纵纹；胸、胁略染红色。

量衡度：

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂(1)		250	26	142	109	24
♀(1)		250	25	145	111	22

国内分布于台湾（留鸟）。为我国特产亚种。

生态 栖息于较低海拔的阔叶林内，一般习性似黑枕黄鹂。

地理分布 国内分布于云南，海南，台湾（留鸟）。国外分布于喜马拉雅山以东至缅甸，泰国，老挝，越南（留鸟）。

5. 鵙鹂 *Oriolus mellianus* Stresemann (图版Ⅱ图3)

别名： 鵙色黄鹂。

英文名： Mell's Maroon Oriole.

Oriolus traillii mellianus Stresemann, 1922, Orn. Monatsh. 30: 64 (模式产地：广东龙头山)。

鉴别特征 雄鸟头、翅黑色；体羽银白色具隐粉红斑；尾红褐色。雌鸟头、翅黑褐；背羽灰色；下体白色具黑纵纹。

形态 （据四川马边采到的标本）

雄性成鸟： 头部辉黑色；背羽银白色，各羽的中段有大形三角形紫红色斑，不同程度的露出于白羽之间，形成零散的羽斑；肩羽与背羽同色；翅覆羽与飞羽均辉黑色；尾羽淡紫红或红褐色，各羽的外翈边缘染以银灰色，羽轴除先端与羽片同色外，余为白色；胸以下的下体与背羽同色；尾下覆羽与尾羽同色，羽缘有宽阔的银白色缘；股羽黑褐。

雌性成鸟： 头黑褐具光泽；背羽灰褐，各羽的羽轴区深褐色，整体具有纵纹；肩羽与背羽同色；翅覆羽与飞羽黑褐色；中央一对尾羽暗紫红色；外侧尾羽内翈大部为粉红色，