

(2) 指名亚种 *Urocissa whiteheadi whiteheadi* Ogilvie-Grant

*Urocissa whiteheadi whiteheadi* Ogilvie-Grant, 1899, Bull, Brit. Orn. Cl. 10: 31 (模式产地: 海南岛五指山).

本亚种的上体是淡褐色, 而西南亚种的上体应为暗煤黑色 (Goodwin, 1976)。中央尾羽应为银灰色, 具黑色次端斑和末端白斑, 西南亚种尾羽基部黑色、末端白斑、无黑色次端斑。

## 量衡度:

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂ (9)	242, 238,	465.5	40.7	206.8	247.1	47.8
	220, 230	(435—490)	(39.5—42)	(197—218)	(227—265)	(45—49)
♀♀ (12)	325.3	463.3	41.3	206.1	237.1	48.2
	(240—490)	(452—486)	(38—44)	(192—230)	(195—253)	(46—51)

国内仅分布于海南岛。国外无分布。

观察标本: 海南岛 9♂♂、12♀♀。




图80 灰蓝鹊 *Urocissa whiteheadi* 的分布图

○ *U. w. xanthomelana*; ● *U. w. whiteheadi*