


生活时背面和腹面前后两端为灰褐色；腹面颜色较浅稍带灰白色。酒精标本颜色改变不大。普通生活在水深 15-30 米有碎贝壳和砾石的硬底，常以腹面附着在贝壳、石块或其他物体上。

主要分布在我国和日本。福建厦门，浙江嵊泗列岛和山东青岛均可采到。

二角赛瓜参 瓜参科 *Cucumariidae*

*Thyone bicornis* Ohshima

体呈纺锤形，两端很尖，长约 5 厘米，直径约 1 厘米。皮肤薄而柔软，表面光滑。管足细小，密布全体，但在辐部仍排成规则的 2 行。触手 10 个，腹面 2 个较小。波里氏囊和石管均为 1 个。呼吸树发达。生殖腺成束，不分枝。



皮肤内的骨片很少，为形如扣状体的桌形体，式样很多，有的底盘为方形，具 4 个大穿孔，排在长轴两端的穿孔相距较远；有的底盘除具 4 个大穿孔外，且有 2-16 个周缘小孔；桌形体的塔部低，由 2 个立柱连接 1-2 次构成，顶端有 2 个分歧的棘(1)。管足内的支持杆状体的底部延长且弯曲，两端各有 1 至数个的穿孔，上部伸出 2 个角状的突起(2)。翻颈部有卵圆形的花纹样体和桌形体。触手内的杆状体有两种：一种细弱，两端有小孔；一种较粗壮，两端具突起；此外还有杆状体和花纹样体结合起来的各种型式。

酒精标本全体为灰色，并有暗棕色的细斑，细斑在间辐部较为明显。

在我国南海，尤其在北部湾内很普通。日本骏河湾也产。多生活在水深 24-85 米的泥沙底。

囊皮瓜参 瓜参科 *Cuoumariidae*

*Stolus sacellus* Selenka

(别名：黑赛瓜参)

体长一般为 7-9 厘米，略呈纺锤形，并稍向上弯。体壁厚而涩硬，有皱纹。触手 10 个，腹面 2 个较小。肛门齿微小，发育不完全。管足遍生全体，常收缩，背面者常变成低疣。波里氏囊通常为 4 个。石管数目很多。

