


刺绵藤壶 藤壶科 Balanidae

*Acasta spinosa* Hiro

周壳圆锥形，峰吻直径7毫米，高8毫米。壳表白色，近顶部呈淡紫色，壳板薄而坚实，表面有尖长的石灰质刺。壳板内面在鞘的下部有短肋，但不伸达到壳板的底缘。底杯形突出，呈倒圆锥形，末端圆突。各壳板顶部尖，易折损，吻板的顶部特别内曲，峰侧板很狭，约为吻侧板宽的1/4。幅部及翼部很宽，幅部顶缘倾斜，表面有不太显著的横纹。壳口大。楯板表面具脊起的生长线，并与微弱的纵线相交织，基背角圆突，开闭缘多齿；关节脊低而长；闭壳肌脊不明显，闭壳肌窝浅；侧压肌窝微弱。背板较薄，顶端呈鸟嘴状，易折损，生长线脊比较低，自顶部到距的部分生长线较弱，其余部分的生长线呈念珠状隆起；内面光滑，呈白色，近顶部呈淡紫色；楯缘弯曲，峰缘微凸；距宽而略短，其宽度约为底缘之1/3，末端平截；具2—3条模糊的侧压肌脊。

采自我国广东海南岛新村内湾，埋居于海绵内，仅露出壳口。

分布于南海、台湾省。



真刺珊藤壶 藤壶科 Balanidae

*Creusia spinulosa euspinulosa* Broch

本种埋居于分枝的石珊瑚 *Madreporaria* 中，露出部呈圆形，有细密的放射肋。露出部峰吻间直径17毫米。壳口小而呈椭圆形。楯板与背板分离。楯板略呈直角三角形，底缘宽，表面具有很匀密的生长线，它的底缘两端各有一个凹陷；开闭缘多齿，大部分的齿区分不很