




[图解] A. 外形; B. 楯板内面; C. 背板内面。

块斑藤壶 藤壶科 Balanidae


Balanus poecilotheca Krügeri

(*Balanus amphitrite poecilotheca* Krügeri)

周壳圆锥形，峰吻间直径 11 毫米，高 6 毫米。壳板光滑，具狭的暗紫色纵行条纹，并有暗红色或暗紫色的横斑纹，横斑与纵纹之间为白色斑。幅部宽，顶缘倾斜，表面有平行横纹；翼部也宽。基底部多孔。楯板三角形，表面具显著的生长线；闭壳肌窝小而明显，闭壳肌脊发达；关节脊达背缘之半，它与闭壳肌脊间有一窄沟；侧压肌窝小而深。背板呈三角形，底缘较宽，在侧压肌脊与距之间的底缘略凹；关节脊发达，短而宽；距宽约为底缘宽的 $1/3$ ，末端圆或斜截；侧压肌脊通常 6 条。

附着于柳珊瑚类 *Gorgonanus* 和水螅类 *Hydroidea* 的干上，其底部常因包住附着基而凹曲。常栖潮下带。

分布于台湾海峡、南海。国外：日本；菲律宾群岛；马来群岛；非洲南部。



[图解] A. 外形; B. 楯板内面; C. 背板内面。

潮间藤壶 藤壶科 Balanidae


Balanus littoralis Ren et Liu

周壳圆锥形，壳表光滑，被腐蚀常呈灰白色，具灰紫色细纵条纹。峰吻直径 19.3 毫米，宽 17.9 毫米，高 12.4 毫米。峰板顶端常外弯，吻板内弯。幅部狭，顶缘斜。翼部宽而薄，顶缘圆斜。壳板内面鞘部约占板的上半部，表面具横纹。壳口中等大，呈五角形，口缘成锯

齿状。楯板狭三角形，外表稍拱，光滑，淡灰紫色，生长线不突出；内面白色，关节脊长约为背缘之半或稍长，关节沟适中；闭壳肌脊长而发达，闭壳肌窝宽阔；侧压肌窝仅在年老个体中明显。背板宽，峰缘稍拱，楯缘直或稍拱，与楯板同色或白色，生长线不突出，中央沟浅而宽，延伸至距末；内面白色，关节脊中等发达，关节沟浅宽；顶部下方稍凹，常具几个低短纵肋；侧压肌脊 4—5 条；年幼个体的距狭长，到基楯角的距离稍小于距宽，在年老个体中距则较宽短，到基楯角间的距离稍大于距宽的一半，末端钝圆。基底白色，有放射管道。

栖息于潮间带，附于码头水泥柱、牡蛎壳、红树皮及石块上。

分布于南海。



三角藤壶 藤壶科 Balanidae

Balanus trigonus Darwin

周壳呈倾斜的圆锥形，峰吻间直径 20 毫米，高 12 毫米。为小形藤壶。每壳板表面呈红色，间以显著的白色纵行的许多细肋。幅部宽，具有斜行的平行沟，其顶缘与壳底几近平行或略斜。壳口呈三角形。楯板表面具有宽的生长线，中央具有深的小陷，排列成纵行的一至四行；楯板狭长，其关节脊长，超过背缘之半；闭壳肌窝显著成椭圆形，闭壳肌脊短而弯曲；侧压肌窝明显；开闭齿少而大。背板狭三角形，关节脊明显，侧压肌脊显著，8 条左右，其上方散有小突起；距宽而短，其宽度超过底缘之半，末端平截，具几个尖锐的突起；距与基楯角很近，几乎相合。

常群栖于贝壳或岩石上，盐度较高、清澄海水的低潮线下以至于深海中生活。浙江外海极为普遍，尤以在螺螺 Turbo、贻贝的壳上颇多。常发现于铃藤壶的壳上。

分布于全世界各海。