


集群藤壶 藤壶科 Balanidae

*Balanus socialis* Hoek

周壳低圆锥形，直径3毫米，高2.5毫米。表面白色有光泽，略具纵条纹。壳口大，盖板高耸于壳口之上。吻板高，顶端向内弯曲。幅部稍宽，顶缘倾斜。翼部很宽，顶不斜，上缘与壳底平行。基底有小孔。各壳板内壁有发达的纵脊起。檐板略呈三角形，表面具明显的生长线，开闭缘呈齿状；关节脊不明显，但延伸较下；闭壳肌窝及侧压肌窝都明显；闭壳肌脊不明显，它与关节脊间有倒V形浅沟。背板三角形，底缘比楯缘略长，成一直线；距较短狭，末端圆突；峰缘弓曲，侧压肌脊很明显，约5条，其末端突出于底缘之外；关节沟明显，较浅，关节脊短；顶不成鸟嘴状。

来自广东遮浪，附铁珊瑚上，与块斑藤壶同栖。

分布于南海。国外：日本；马来群岛；斯里兰卡。



[图解] A. 外形; B. 楯板内面; C. 背板内面。

玲珑藤壶 藤壶科 Balanidae

*Balanus ciliatus* Hoek

周壳圆锥形，稍侧扁。峰吻直径19.4毫米，宽8.4毫米，高11.3毫米。壳表光滑，白色到淡粉红色，有紫红色纵条纹，有时有模糊的淡紫色斑块散布。吻板色略淡，峰板高而尖。幅部宽，顶缘斜，常有褐色到紫红色纵条纹断续相交，有横沟纹。翼部薄，顶缘稍斜。鞘短，具平行横纹，鞘下有纵肋直到基底。壳口大，菱形到五角形，边缘呈锯齿状。盖板内部紫红色。楯板呈窄长三角形，顶端较尖，外表污白，有模糊淡红色纵条纹，生长线不显，开闭缘有齿；内面关节脊不突出，长度超过背缘之半，下端斜截，关节沟较窄；闭壳肌脊不明显。背板通常较窄长，峰缘上部稍突出，外面生长线不显，中央沟不明显下凹；内面关节脊清楚，关节沟浅，上端有三角形顶叶；距末端一般钝圆或斜截，有时见小齿；侧压肌脊发达，5—7条。

栖息于浅海，常与块斑藤壶共同附于柳珊瑚上。

分布于东海、南海。国外：日本；菲律宾；马来群岛及印度洋。