


形，与基楯角相接处圆滑；侧压肌脊明显，4条。

附着于鳞笠藤壶及铃藤壶的外壳上。

分布于南海、台湾。国外：马来群岛；菲律宾群岛；西太平洋。




齿底小藤壶 小藤壶科 Chthamalidae

*Chthamalus intertextus* Darwin

周壳扁平，壳口大，呈菱形。壳表呈鲜青紫色，但常被侵蚀而呈灰色。表面光滑或微隆起，底缘多凹凸不平。翼部顶端与壳底缘平行，具横纹；幅部边缘呈锯齿状弯曲。壳内面呈美丽的青紫色，底缘呈波形而向内弯曲。周壳底部的中部膜质，而周缘钙质。楯板与背板常愈合在一起，表面仅见缝合线的痕迹。楯板较狭，闭壳肌窝浅；无闭壳肌脊；无侧压肌窝。背板三角形，上部宽，下部狭；在楯缘附近具一小形距；侧压肌脊发达，其末端超出底缘。

附着于高潮带岩石上或岩石下。

分布于我国台湾。国外：菲律宾群岛；夏威夷；琉球群岛。



波纹小藤壶 小藤壶科 Chthamalidae

*Chthamalus caudatus* Pilsbry

峰吻间直径10毫米，宽6毫米，高2.7毫米。周壳外形狭长，壳表呈淡黄色，但被钙藻腐蚀者呈灰色；壳板外面有波状生长线，尤以其下部为显，其底缘具不明显的隆起；幅部不明显，在吻侧板边缘呈波形弯曲或不明显，翼部显著，上有横纹。壳口卵形。楯板外面具生长线；关节脊在中部圆而低突；无闭壳肌脊，闭壳肌窝浅；沿开闭缘具发达的隆起。背板狭窄，上半部稍宽，下部较狭；侧压肌脊发达而超出底缘，约为10条。

附着于潮间带高潮区的岩石及龟足的壳板上。