




〔图解〕 A. 外形；B. 楯板内面；C. 背板内面。


白条小藤壶 小藤壶科 Chthamalidae

*Chthamalus withersi* Pilsbry

周壳扁平，峰吻间直径9毫米，宽9毫米，高3毫米。壳口宽大；壳板棕褐色或棕肉桂色，表面平滑，近基部色深且略有皱襞。翼部宽大，顶端略平；幅部狭，顶端甚倾斜。各板间缝合线平滑。楯板三角形，薄，外面呈深褐色，具有与底缘平行的生长线；自顶端向底缘散有白色放射状浅纹，以背缘及开闭缘附近较为显著；内面色浅，散有点状小凹；关节脊稍突，隆起的顶端恰在背缘中央；闭壳肌窝椭圆形，闭壳肌脊不显著；侧压肌窝小而深。背板略呈三角形，下半部较狭长，内面与楯板同，散有点状小凹；峰缘圆突，底缘稍弯，基楯角圆；关节脊长，在近底缘部分形成一浅凹；侧压肌脊明显，2—3条。

附着于石块、牡蛎壳、白脊藤壶、鳞笠藤壶壳上及红树干和叶上。

分布于南海。国外：菲律宾群岛；印度尼西亚的爪哇、苏拉威西；马来西亚；西太平洋。



〔图解〕 A. 外形；B. 楯板内面；C. 背板内面。

直背小藤壶 小藤壶科 Chthamalidae

*Chthamalus moro* Pilsbry

周壳圆锥形，峰吻间直径8毫米，高3.5毫米。壳表灰白色，具粗隆起。壳板的幅部狭，翼部较宽；缝合线明显，简单。楯板三角形，底缘略长于背缘；内面白色，关节脊长直，其突出的顶部略超过背缘的中部，稍突；闭壳肌窝长椭圆形，闭壳肌脊不显；侧压肌窝深，内有较显著的压肌脊。背板三角形，底缘弯曲；关节脊明显，关节沟稍狭；距短而宽，半圆