


细板条茗荷 茗荷科 Lepadidae
Conchoderma virgatum hunteri (Owen)

体比条茗荷为小，头状部长 15 毫米，柄部长 8 毫米。外皮薄而不透明，呈均匀的暗紫色，有时有明显的 5—6 条暗紫色纵条纹。头状部与柄部两者间的区分不明显。头状部的峰侧缘呈弓形突出。壳板较细小，白色。楯板分三叶，壳顶在开闭缘的中央。背板呈细棒状，其基半部略弯曲呈~字形，并与峰板的上半部平行。峰板粗棒状，上下端钝圆，中间稍凸；其上端与背板下端有一段间隔。具尾突。鞭状突在第一蔓足的足基有 2 个，并在这下方的体侧有 1 个，第三一五各蔓足的足基各 1 个，各侧合共 6 个，都比各蔓足短。交接器长为第六蔓足之半。

附着在船后的底部、海蛇、梭子蟹上。采自南海浮标上。

分布：东海、南海。国外：印度洋；马来群岛；日本的相模湾、纪伊濑户、土佐湾。



水母软茗荷 茗荷科 Lepadidae
Alepas pacifica Pilsbry

外皮薄而透明，几丁质化。头状部较扁，外套口宽大，占开闭缘的上半，其两侧缘呈弓状弯曲；外套口下端两侧有石灰质化不完全的白色楯板，呈小 Y 字形，各枝的先端都尖细；峰侧缘显著弯曲。柄部细小，圆筒状。鞭状突在第一蔓足的足基有 2 个，并在它的下方体侧