


条暗紫色纵条纹，但不很显著。鞭状突在第一蔓足的足基具 2 个，它的下方体侧具 1 个，在第二—五蔓足的基部各具 1 个，合计各侧有 7 个，它们的长度均为各蔓足的两倍且弯曲。交接器粗短。头状部长 40 毫米，柄长 70 毫米。

采自东海某船底的尾部。主要附着于鲸类体外附生的鲸藤壶类 *Coronula* 上。

分布：广泛分布在各大洋。为世界种。



条茗荷(条茗荷儿) 茗荷科 Lepadidae

*Conchoderma virgatum* (Spengler)

头状部长 23 毫米，宽 16 毫米。柄部长 24 毫米。表面光滑。头状部略呈四边形，左右扁，中央稍隆起，顶缘略平而稍下凹；外皮薄，不成几丁质化而似软皮，呈灰色，每侧有三条暗紫色的纵行斑纹，从顶端通达到柄部。头状部具有 5 个细长而扁平的小壳板，均沿边缘排列，每壳板末端都埋入皮下。楯板一对，分三枝，其在中间的一枝粗而短，基部隆起，末端圆而斜向内方，其余二枝都成棒状，向上下排列而成一直线，并且紧贴头状部边缘；背板一对，最细，横列于顶缘；峰板最长，近下端部分略向内方弯曲。柄部呈圆筒状而中空，较坚硬，末端附着于他物上。

常附着于海龟、船底及飞鱼、旗鱼身上。

分布：太平洋及印度洋。