


雄性腹部呈长条状，分七节，第四节的末缘突出，密具短刚毛，盖于第五节上，此为本属的主要特点之一。头胸甲长 6.1 毫米，宽 7.6 毫米。

穴居于潮間带的泥沙中，为一种羣居性蟹类。

分布于中国广东(海南島)；印度尼西亚(苏門答腊)；泰国；印度。




巴氏无齿蟹 方蟹科 Grapsidae

Acmaeopleura balssi Shen

头胸甲的宽度稍大于长度，呈圆方形，表面隆起具凹点，分区不明显。额后的隆脊隐约可辨。胃、心区之间具一细沟。头胸甲的边缘具颗粒隆线，唯后缘的隆线光滑。额宽约当头胸甲宽度的 $1/3$ ，前缘由背面观横切，由前面观则呈宽三角形，表面中央具一短浅的纵沟。眼窝深，眼柄短，眼窝腹缘的内齿大而钝，下眼窝脊显著而光滑，似分三段，最外一段最短，状如圆形或三角形颗粒。第三颚足的座节及长节的宽度均大于长度。螯足对称，较头胸甲为长，长节内腹缘的末部具一发音隆脊，腕节隆起，内末角钝圆，掌节具微细颗粒，内、外面隆起，上半部各具一横行隆线，外面的下半部具一微细颗粒的隆线，由基部延伸至不动指的末端，两指较掌节为短，内缘各具 6 个约等大的钝齿，基部无毛。步足指节呈针棒形，其余各节的背缘及腹面均具微细颗粒。雄性腹部呈三角形，雌性腹部呈圆形。头胸甲长 9.6 毫米，宽 11.8 毫米。

采自泥、沙质的浅海底上。

分布于中国山东半岛(烟台之东)。



绒毛近方蟹 方蟹科 Grapsidae

Hemigrapsus penicillatus(de Haan)

头胸甲呈方形，前半部较后半部稍宽，表面具细凹点，前年部各区均具颗粒，肝区低凹，前胃及侧胃区均隆起，被一纵沟所分隔。前鳃区的前围具 5 个凹点。额较宽，前缘中部稍凹。下眼窝脊的内侧部具 6—7 枚颗粒，外侧部具 3 枚钝齿状的突起，愈到外端则愈小。前侧缘分 3 齿，由前至后依次渐小。螯足，雄比雌大，长节的腹缘近末部处具一发音隆脊，腕节隆起具颗粒，掌节大，外侧面近腹缘处具一明显颗粒隆线，延至不动指的外侧面，内、外面近两指的基部具一丛绒毛，尤以内面的较外面为密，在雌性及雄性幼体则均无，两指较掌节为长，其内缘具不规则的钝齿。第二对步足最长，长节背缘近末端处具一齿，腕节背面具 2 颗粒隆线，前节背面中间具沟，并具小束短刚毛，指节有 6 列短刚毛，末端尖锐而呈角质，第四对步足最短。腹部，雄性呈三角形，雌性呈圆形。头胸甲长 30.6 毫米，宽 34.5 毫米。