


紅色相机蟹 长脚蟹科 Goneplacidae

*Camatopsis rubida* Alcock et Anderson

头胸甲近似四方形，背面自前至后略为隆起，靠近两侧缘具少数细颗粒。额窄，向前下方倾斜，前缘中部略凹，形同分为两圆叶。眼窝小，眼无色素。前侧缘呈弧形，后侧缘向后略为分展。头胸甲最宽处介于第三对步足基部之间。后缘的两侧向前外方倾斜，中部平直，且较额缘稍宽。螯足瘦长，较第一或第四步足为长，而较第二或第三步足为短，两指的末端可以会合，可动指的内缘具不规则的齿，不动指内缘的末部具 1—2 枚锐齿。步足除长节外，其他各节均具刚毛，指节扁平，向外弯曲。头胸甲长 11 毫米，宽 12 毫米。

生活于水深 70—500 米的沙质或泥质杂有贝壳的海底上。

分布于我国南海；日本；暹罗湾；印度尼西亚各海区；印度洋的安达曼海。



锯齿溪蟹 溪蟹科 Potamonidae

*Potamon (Potamon) denticulatus* (H.Milne-Edwards)

头胸甲的宽度略大于长度，表面稍隆，前半部具少数颗粒，后半部光滑。额区的一对隆起各具横行皱襞。眼窝后部的隆起也明显。中胃区与心区之间有明显的“H”形沟，侧胃区的后侧部亦隆起，鳃区稍隆起，其中部具一沟，斜向中胃区。额宽，向前下方倾斜，前缘中间凹陷，表面具颗粒。眼窝背、腹缘及外眼窝齿的边缘均具细锯齿。外眼窝齿与前侧缘之间具一缺刻。前侧缘稍弯曲，具细齿。两性螯足均不对称，长节的边缘有锯齿，背缘近末端处具一小齿，腕节的内末角具一锐刺，外侧末缘具小齿数枚，掌节肿胀，指节光滑，两指内缘具不规则齿。第二对步足最长，长节背缘具皱襞，腕节前缘有小刺，前节的背腹缘均具小刺，指节周围具棘。头胸甲长 35.8 毫米，宽 43.2 毫米。

多栖息在河、湖、水田或山溪中，常潜伏在砖石下。当地居民有时捕捉此蟹作为食用，或埋在田中作为把料。此蟹为人类肺蛭的中间宿主，为了保持健康，食前应充分煮熟。

分布于中国山东、河南、安徽、江苏、浙江、福建、江西、四川等省，分布广泛，为我国特产。