


隆背瓢蟹 扇蟹科 Xanthidae
Carpilius convexus (Forsk ◆I)



头胸甲前部 2/3 呈半圆形，后部 1/3 趋窄。表面较为平滑，分区不明。额宽，中部突出并向前下方弯曲，但其前缘从背面观几乎平直。眼窝背缘较厚而略为隆起，缓缓向后侧方倾斜。前侧缘呈圆弧形，后侧缘向内后方倾斜，开始处具一钝角状突出。后缘与额缘几乎等宽而平直。螯足强大，左右不等称，腕节的内末角钝，大螯掌节高大，两指内缘近基部处具一钝齿，步足光滑，各节的前缘锋锐。头胸甲长 56 毫米，宽 78 毫米。

分布于中国广东(海南岛)、台湾；日本；夏威夷；波利尼西亚；印度洋；红海与东非。

红纹斗蟹 扇蟹科 Xanthidae
Liagore rubromaculata de Haan

头胸甲的宽度大于长度，呈横卵形，前后左右均隆起，表面较为平滑，除对称分布的红色圆斑之外，具微细凹点及颗粒，分区不甚明显，唯胃、心区之间有显著的“H”形细沟。前侧缘光滑无齿，后侧缘大于前侧缘，前后侧缘形成弧状。额宽，中间被一细缝分为两叶，各叶前缘靠近内眼窝角处稍凹入。眼窝小，眼柄粗短。螯足对称，光滑，长节边缘具短毛，背缘具数钝齿，腕节外末角及内末角钝而突出，掌节与指节约等长，两指内缘均具不规则的钝齿。步足瘦长，呈圆柱状，平滑有光泽，以第一对步足为最长，此后各对依次渐短，指节尖锐，均具短毛。螯足与步足的表面与头胸甲具同样的红色圆斑。雄性腹部呈长三角形，第三至第五节愈合，但节缝仍可分辨，尾节末端钝圆，边缘具短毛。头胸甲长 27.5 毫米，宽 37 毫米。

生活于浅海细沙质海底上。

分布于中国广东、福建；日本；印度。