


基斯坦；波斯湾；东非。




黑点花神蟹 扇蟹科 Xanthidae

Chlorodiella nigra (Forsk ♦I)

头胸甲呈横六角形，表面扁平而光滑，胃、心区有“H”形细沟。额与眼窝的总宽度大于头胸甲宽度的 $3/4$ 。额宽而平直，前缘中部有一小缺刻分为两叶。额后有可辨的隆脊，背眼窝线倾向后侧方，有一浅沟围绕。前侧缘分 4 叶，第一、二两叶小而圆钝，第三、四两叶较尖，且齿状，第四叶较第三叶为小。后侧缘较前侧缘为长。螯足不对称，大螯长度约为头胸甲长度的 2 倍，表面光滑，长节的末半部露出头胸甲之外，腕节内末角甚突，大螯可动指内缘中部之前有一个较大的钝齿，基部有两个小钝齿，不动指内缘基部有一大钝齿及一不甚明显的小钝齿，小螯两指内缘的钝齿均不显著，两螯指的指端均呈匙形。步足各节均密具刚毛，间有细长硬刚毛。腹部，雌性呈卵圆形；雄性呈窄条形，第三至第五节愈合。头胸甲长 10.5 毫米，宽 14.8 毫米。

生活于珊瑚礁上或有石块的岸滩上，常为蟹奴所寄生。

分布于中国广东(海南岛)；印度太平洋区。



光辉圆扇蟹 扇蟹科 Xanthidae

Sphaerozium nitidus Stimpson

头胸甲背部隆起，表面光滑，分区不甚明显。额的宽度小于头胸甲宽度的 $1/3$ ，前缘