

羊毛絨球蟹　蜘蛛蟹科 Maiidae

Doclea ovis(Herbst)

头胸甲呈圆球状，表面隆起，密具短絨毛，裸露时分区可辨，井有許多突起，沿中綫，额区及胃区有 4 顆突起，心区 2 顆，后者較突，腸区 1 顆似已退化，由前胃区向中腮区斜行，有一列 5—6 个突起。前侧緣具 3 銳齿，后侧緣具一鈍齿。眼窝小，外眼窝齿銳，向内弯曲。額窄，向前伸出，分为 2 齿。螯足对称，长度与头胸甲的长度相近，长节密具絨毛，腕、掌及指节均光滑，指节較掌节略短，内緣具細齿。步足均为圓柱形，除指节外均密具短絨毛，第一对步足的长度約当头胸甲长度的 2 倍，唯指节的基中部亦密具短絨毛，其他步足的长度依次漸短。接近腹部末端两侧的腹甲上各具一突起。两性腹部均分 7 节，雄性第三节最寬，第四节以后，各节的寬度驟減，尾节末端鈍圓。头胸甲长 53 毫米，寬 46 毫米。

生活于河口的泥底或距海岸不远的泥滩或卵石滩上。

分布于中国广东、福建；日本；广泛分布于印度太平洋的热带区。



多刺蜘蛛蟹　蜘蛛蟹科 Maiidae

Maja spinigera de Haan

头胸甲扁平，表面具顆粒，各顆粒負数根弯曲的刚毛，沿中线具 5 刺，胃区占 3 枚，心区和腸区各占一枚，鳃区表面具 2 刺，前一刺短小，指向前侧方，后一刺校长大，指向后侧方。头胸甲的后緣具并立的两刺。額刺一枚，向前下方突出，額角一对呈长筒状，約当头胸甲长度的 1 / 4，向前分展。前眼窝齿无，后眼窝齿尖锐，肝区边緣具 2 长刺，鳃区边緣具 4 长刺，又随着 4—5 小齿，在肝区与鳃区的长刺之間各具一小刺，在后眼窝齿与肝区第一长刺之間也具一小刺，肝区下面具直立的小刺。第 2 触角基节的外緣基部具一刺，基节的末端具 2 刺(一在腹面，一在外侧面)。螯足瘦长而光滑，掌节略为膨胀，两指基部间具空隙，可