


习居于沼泽地带的洞穴中。

分布于中国台湾；薩摩阿羣島；塔希提；自印度太平洋区直到东非。




毛足圓軸蟹 地蟹科 Gecarcinidae

*Cardisoma hirtipea* Dana

头胸甲表面隆起，尤以前鳃区为甚，其他各区的分界亦較明晰，胃、心区之間的界沟特別深刻，額緣与眼窝背緣的寬度略相等，額緣中部略为內凹，額后叶不若前一种的显著，接近眼窝背緣与头胸甲側緣的表面具不甚明显的顆粒，后側面具斜行条紋。眼窝外角与前鳃齿之間的距离較前一种的为大，前腮齿后面的側緣不甚拱起。口框呈长方形。第三对顎足之間具一斜方形空隙，外肢頂端具一鞭。雄性螯足不对称，雌性的对称，腕节內末角突出且齿状，它与掌节的外側面均具少数凹点。步足长节的前緣无毛，只有后緣具較多刚毛。头胸甲长 50 毫米，寬 61 毫米(雌性)。

常穴居于沼泽地带的泥洞中。

分布于中国台湾；日本；夏威夷；澳洲东部与新西兰。



兰氏地蟹 地蟹科 Gecarcinidae

*Gecarcoidea lalandii* H. Milne-Edwards

头胸甲表面的側胃区和肝、鳃区都很隆肿，心区周围較为平坦。額区表面中央的縱沟深刻，側胃区兩側的縱沟，也很深刻。額較眼窝为寬，向前下方傾斜，前緣横截，側緣內凹。眼窝的外側具一凹陷，在此凹陷的前下方具一顆粒隆錢，眼窝腹級的内齿和額相接触，内齿与眼窝腹緣之間有一裂縫相隔。口前部密盖著短絨毛。第三对顎足座节的內側部突出，长节較小而向内傾斜，因此在这对顎足之間具一斜方形空隙，外肢短而无鞭，可以全部隱藏在內肢之下。两性螯足对称，长节的背面及外側面具細的顆粒錢，前緣具粗顆粒，腕节、掌节及指节的表面密具麻点及扁平的細顆粒。步足各節的背、腹面均具顆粒或形成皺紋，腕节的前緣具角質細刺一列，前节的前緣具 2 列，指节的周围具 6 列。头胸甲长 45.5 毫米，寬 59 毫米。

生活在潮湿的泥地上，每屆雨季繁殖时期，常迁移下海，不久即可在海边采到它的大眼幼虫和幼蟹。

分布于中国西沙羣島、台湾；菲律宾；印度尼西亚(西伊裡安)；印度洋各島。

