


隆背黄道蟹 黄道蟹科 Cancridae

*Cancer gibosulus* de Haan

头胸甲亦呈圓菱形，表面的各区可以辨認，各区的隆起部分均有細顆粒。額窄，不若前一种的突出，分 3 齿，居中的一枚較窄而突出，兩側的呈三角形。內眼窝齿及眼窝背緣的齿突均呈三角形，唯不若前一种的那样突出。前側緣包括外眼窝齿共具三角形齿 9 枚，大小相間，末齿之后，即在內凹的后側緣的前部又具一小齿。第二触角基节的外末角突出，此突出从背面內眼窝齿之前也可看到。螯足的腕节与掌节均具細刺和軟毛，掌节外側面的細刺均排成纵列。步足的指节瘦长，較前节为长。头胸甲长 19 毫米，寬 21 毫米。

生活于水深 30—100 米的泥沙质或貝壳与沙质相混的海底上。

分布于中国辽东半島；朝鮮海峡；日本。




脆弱暴蟹 扇蟹科 Xanthidae

*Halimede fragifer* de Haan

头胸甲的寬度稍大于长度，呈五角形，表面隆起，各区具大小不等、扁平而孤立的突起，突起之間具短絨毛。額較眼窝为突出，两者的边缘均較厚而隆起，額的前緣中部被一纵沟分为 2 叶，各叶前緣均呈横切形，并有扁平的顆粒，額部側緣与內眼窝角之間具一較深的缺刻。背眼窝緣向后側方傾斜，亦具顆粒，腹眼窝緣具 2 明显的缺刻。前側緣的前半部具 3 个較大的平疣，后半部具一个較大、2 个較小的疣。后側緣較前側緣为长，具有数个小疣。螯足腕节及掌节的外側面各具 10 个左右扁平的疣状突起，两指之間具空隙。步足各节的前、后緣均密具短刚毛，指节細长。头胸甲长 19 毫米，寬 22 毫米。

生活于水深 20—50 米的泥质或泥沙质的海底上，有时亦发見在具貝壳的海底上。

分布于中国广东；日本。



算命暴蟹 扇蟹科 Xanthidae

*Halimede tyche* (Herbst)