





羊毛絨球蟹 蜘蛛蟹科 Maiidae

Doclea ovis(Herbst)

头胸甲呈圆球状，表面隆起，密具短絨毛，裸露时分区可辨，并有許多突起，沿中綫，額区及胃区有 4 顆突起，心区 2 顆，后者較突，腸区 1 顆似已退化，由前胃区向中腮区斜行，有一列 5—6 个突起。前侧緣具 3 銳齿，后侧緣具一鈍齿。眼窝小，外眼窝齿銳，向内弯曲。額窄，向前伸出，分为 2 齿。螯足对称，长度与头胸甲的长度相近，长节密具絨毛，腕、掌及指节均光滑，指节較掌节略短，內緣具細齿。步足均为圓柱形，除指节外均密具短絨毛，第一对步足的长度約当头胸甲长度的 2 倍，唯指节的基中部亦密具短絨毛，其他步足的长度依次漸短。接近腹部末端两侧的腹甲上各具一突起。两性腹部均分 7 节，雄性第三节最寬，第四节以后，各节的寬度驟減，尾节末端鈍圆。头胸甲长 53 毫米，寬 46 毫米。

生活于河口的泥底或距海岸不远的泥滩或卵石滩上。

分布于中国广东、福建；日本；广泛分布于印度太平洋的热带区。



多刺蜘蛛蟹 蜘蛛蟹科 Maiidae


Maja spinigera de Haan

头胸甲扁平，表面具顆粒，各顆粒負数根弯曲的刚毛，沿中綫具 5 刺，胃区占 3 枚，心区和腸区各占一枚，鳃区表面具 2 刺，前一刺短小，指向前侧方，后一刺校长大，指向后侧方。头胸甲的后緣具并立的两刺。額刺一枚，向前下方突出，額角一对呈长筒状，約当头胸甲长度的 $1/4$ ，向前分展。前眼窝齿无，后眼窝齿尖锐，肝区边緣具 2 长刺，鳃区边緣具 4 长刺，又随着 4—5 小齿，在肝区与鳃区的长刺之間各具一小刺，在后眼窝齿与肝区第一长刺之間也具一小刺，肝区下面具直立的小刺。第 2 触角基节的外緣基部具一刺，基节的末端具 2 刺(一在腹面，一在外侧面)。螯足瘦长而光滑，掌节略为膨胀，两指基部間具空隙，可

动指近基部处具一齿。步足具黄色细长刚毛，各长节背缘的末端具一锐刺。两性腹部均分 7 节。头胸甲长 92 毫米，宽 75 毫米，额角长 26 毫米。

生活于水深 50—150 米的泥质或杂有贝壳的海底上。

分布于中国台湾；日本。




粗甲干枯蟹 蜘蛛蟹科 Maiidae

Schizophrys aspera(H. Milne-Edwards)

头胸甲除额部及眼窝外，近圆形，表面不甚隆，密布小颗粒，其中有許多尖锐的刺状突起，肝区多为尖锐的小刺，颊区具粗糙的颗粒。额突出，伸出两刺，稍向内弯，外缘基部各有一刺，两额刺中间有一三角形短刺。眼窝前、后各有 2 短刺，下眼窝齿小且锐。前侧缘具 6 刺，肝区一个，其余均在鳃区，末两齿较小。螯足很长，对称，长节及腕节均复以尖锐的小刺，掌节光滑，仅在背缘基部具 1—2 小刺，雄性两指间的空隙很大，不动指的末端呈匙状，可动指向内弯曲，内缘近中部具一较大的钝齿，近末端处具一小齿。步足密复短绒毛，长节背缘的末端具一小齿。两性腹部均分 7 节。头胸甲长 48 毫米，宽 42 毫米，额角长 18 毫米。

多栖息于沿岸带的海底岩石间。

分布于中国广东；日本；东非；广泛分布于印度太平洋的热带区。



长足长跨蟹 蜘蛛蟹科 Maiidae

Phalangipus longipes(Linné)

头胸甲的长度大于宽度，分区明显，表面复以短毛，胃区、鳃区及额部均有卷曲的刚毛。中胃区具 4 颗突起，前胃区一个较大，后胃区 3 个，心区一个，肠区具一个很高的突起，指向后方，两边各具一小突起，肝区 3 个，前鳃区 2 个较大，中鳃区 5 个，后鳃 2 个，颊区具一大锐齿，其基部具一小齿，在雌体有时不明显。额大，呈三角形，表面稍隆，中具一沟，前端分 2 齿，侧缘基部各具 2 锐齿。螯足，雄此雌大，长节呈圆柱形，末端具一小刺，腕节短，掌节长，指节短而内弯，内缘具细齿，雄体的可动指较不动指为窄，内缘基部具一大齿。