


四齿磯蟹 蜘蛛蟹科 Maiidae

*Pugettia quadridens*(de Haan)

头胸甲表面密布短絨毛，并分布着大头棒形的刚毛，这在疣状突起、角状突起或球状突起上均較明显。肝区的边缘向前后各伸出一齿，与后眼窝齿以凹陷相隔，侧胃区具一系列斜行的弯曲刚毛，中胃区甚凸，具 2 个疣状突起，前、后排列，心、腸区亦甚隆，呈球状，但无疣状突起。額突起，向前伸出两根角状銳刺，内緣具长刚毛，背面复以弯曲的刚毛。螯足对称，雄此雌大，长节近长方形，背内緣具 4 个負刚毛的疣状突起，外緣具 2 个，腹外緣 3 个，腕节隆起，掌节的长度大于高度，内、外面隆起，指节較掌节略短。步足常具軟毛，間有若干刚毛，第一对最长，向后諸对渐短，长节背面平滑，腕节背面具一凹陷，前节及指节均为圓柱形，前节长，腹面中間及末端共具刚毛两簇，指节腹面具刷状刚毛，末端角質，銳而无毛，向下弯曲。头胸甲长 13.8 毫米，寬 10.2 毫米。

生活于低潮线，有水草、泥沙的水底，有时潛伏在具海藻、泥沙岸边的岩石縫中。

分布于中国的辽东湾、渤海湾，由山东半島一直延至南海；日本亦有。




单角名城蟹 蜘蛛蟹科 Maiidae

*Menaethius monoceros*(Latreille)

头胸甲呈长三角形，表面扁平，胃、心区及腸区均稍隆起，前者具 3 疣，后两者各具一疣。肝区边缘具 2 齿状突出，前齿較后齿为大。鰓区侧緣也具 2 齿，前齿較后齿为小，表面有 1—2 个突起。后緣的左右两端亦各具一突起。雄性額部較长，向前伸，唯稍向下弯，末端分 2 小齿，雌性額部常較短。眼窝小，眼柄常伸出。前眼窝角突出，呈銳三角形，后眼窝角稍隆不显著。第二触角基节的基部寬，鞭部細长，超越額角的末端。第三顎足长节的外末角突出。雄性螯足壮大，长节背緣近基部处具数疣，末端具 3 枚不显著的鈍齿，掌节侧扁，上、下緣均鈍圆。两指間在基部处空隙較大，可动指内緣基部具一壮齿。步足长节的前緣具数个带毛的疣，指节后緣均具小刺。雄性腹部分 7 节；雌性腹部分 5 节。头胸甲长 17 毫米，寬 13 毫米。

生活于低潮线的水草間或岩石旁。

分布于中国广东(海南島)、台湾；日本；泰国；夏威夷；印度；紅海；非洲东岸；广泛分布于印度本平洋区。



异形藻片蟹 蜘蛛蟹科 Maiidae


*Huenia proteus de Haan*

雄性：头胸甲呈长三角形，表面扁平，胃区有 3 顆疣状突起，呈三角形排列，前面两顆，后面一顆，心区有一錐形疣状突起，前侧緣或肝区边缘具一銳齿，有时呈叶片状突出，侧緣或鳃区边缘具一角状突起，有时亦呈叶片状突出。后緣近于平直，唯中部稍突。额长，背面呈銳三角形，下面侧扁，侧緣具短毛。前眼窝齿尖銳，无其他的眼窝齿。螯足壮大，但較第一对步足为短，长节光滑，背面有不明显的突起，腕节外緣具隆脊，掌节侧扁，背、腹緣具隆脊，可动指内緣基部具一大齿。步足扁平，前、后緣均具隆脊。腹部分 7 节。头胸甲长 19 毫米，宽 20 毫米。

雌性：額的后半部呈三角形，前半部呈針状。前眼窝齿距眼較近，向内弯。胃区中部具 3 顆疣状突起，心区的疣不甚突起。前侧缘具一叶片状突出，很寬大，侧緣具一較小的叶片状突出。螯足不此步足粗壮。腹部分 5 节，第四至第六节愈合。头胸甲长 22 毫米，宽 17 毫米。

栖居于海边岩石或藻类間，有时生活在具卵石的海底，一般水深下超过 50 米。

分布于中国广东；日本；夏威夷；印度洋；紅海。



双角互敬蟹 蜘蛛蟹科 Maiidae

*Hyastenus diacanthus(de Haan)*

头胸甲在額部之后呈三角形，表面及肢体均密具絨毛，裸露时，表面光滑。胃区甚隆，沿其中綫具疣状突起两枚，后居者較前居者为显著，侧胃区也各有一較小而低的突起，心区及腸区略为隆起，后者具一小而低的突起。鳃区不甚隆起，具一尖銳的侧刺，位于前侧緣与后侧緣的連結处。额分两长角，其长度不及头胸甲长度之半。眼窝前齿与后齿均圆鈍，这两