


凹陷。額角向前伸，前緣从背面观横切，表面中央具一纵沟；从前面观，額角呈三角形。眼窝小，眼大而突出。第三顎足座一长节的外緣呈弧形，内末角突出，前节长大，指节呈小条状，着生在前节内緣的中部，远不能达到前节的末端。螯足具歌毛，掌节的内面较外面尤为隆起，可动指内緣基部 $1/3$ 处具一齿，不动指内緣基部具 2 齿，两指的末部各具一系列細鋸齿，末端内弯。步足也具软毛，第一至第三对依次渐长，第四对最短小。各足的前节較腕节寬，指节的末端稍向内弯。第四对步指的指节与前节約等长。腹部呈窄三角形。头胸甲长 3.3 毫米，寬 3.5 毫米。

此蟹与杂色蛤仔、牡蠣、金蛤、鳥蛤、貽貝、*Paphia philippinarum* 及 *Paphia variegata* 等共生。

分布于中国辽东半島及山东半島；日本。




寬腿巴豆蟹 豆蟹科 Pinnotheridae

Pinnixa penultipedalis Stimpson

头胸甲的寬度大于长度約 2 倍余，表面光滑，胃心沟显著，胃区前具一浅沟。額窄，前緣横切，中部具一浅凹，表面中央具一浅纵沟。外眼窝角后有一斜沟，向下眼窝区延伸，斜沟之后又有一小凹陷。前側緣甚拱，后側緣甚为傾斜，两者交界处最为突出。口框向前趋窄，第三顎足各节邊緣均具长羽状刚毛，座节与长节愈合，其他各节与三强蟹的大致相似。螯足小，掌节背緣具 6—8 个疣状突起，外側面上半部具一系列刚毛。可动指背面具 4—5 疣状突起。第一对步足短小，前节后緣的末部具一系列小刺，指节前緣具 5—6 小齿，近末端处具一簇刚毛。第二对步足較长，长节后緣具顆粒，前节与第一对步足相似，指节前緣具 5 小齿，后緣有一列小刺，末端亦具一簇刚毛。第三对步足最长大，长节甚寬壯。第四对步足最小，长节后緣具 4—5 鈍齿，指节前緣具 3 小齿。雌性腹部呈卵圓形。头胸甲长 2.5 毫米，寬 5 毫米。

发見在近岸的泥质海底上，居于多毛类(*Potamilla* sp.)的管道中。

分布于中国广东、胶州湾；日本。



肥壯巴豆蟹 豆蟹科 Pinnotheridae

Pinnixa tumida Stimpson