


Oregonia gracilis Dana

头胸甲近似三角形，表面各区隆起，并有不定形的疣状突起，在突起上常饰以弯曲的刚毛。胃、鳃及心区均较隆起，后胃区凹陷。下肝区突出如半球形，具疣状突起。额突出，分成 2 根细长而并行的角状刺，唯末端向左右分开。上眼窝缘斜向后侧方，后端呈角状突出，后眼窝刺长且锐。眼柄伸出，其长度与后眼窝刺约相等。雄螯较步足为长，雌螯则较短。长、腕及掌节的背缘均具疣状突起。可动指的长度约当掌节的 $\frac{2}{3}$ — $\frac{3}{5}$ ，其内缘基部 $\frac{1}{3}$ 处具一钝齿，不动指基部具一较小的齿，有时无。步足呈圆柱形，多少具软毛，第一对最长，向后诸对渐短，长节为腕节长度的两倍余，前节的长度约当腕节或指节的 1.5 倍。两性腹部均明显地分为 7 节，雄性腹部沿中线隆起，第六节的外末角突出，第七节短而宽，末缘的中部稍突；雌性腹部大，复盖整个胸部的腹甲。头胸甲长 33.3 毫米，宽 26 毫米。

生活于浅水或水深 370 米的海底泥沙上。

分布于中国渤海湾；日本；白令海到加利福尼亚。



缺刻磯蟹 蜘蛛蟹科 *Maiidae*

Pugettia incisa(de Haan)

头胸甲表面的各区均隆起，胃区具一疣状突起，心区的疣状突起呈锥形，鳃区的疣状突起稍向后突出，表面盖有短毛及大头棒形的刚毛，肝区的边缘呈叶片状突出，前端呈锐刺状，后端钝，鳃区的隆起呈球状，并向后侧方伸出一钝齿，肝区与鳃区的边缘之间具一大缺刻。前眼窝刺锐而突出。额分 2 锐刺向左右展开成 60° 角，其长度约当头胸甲长度的 $\frac{1}{1}$ ，复有弯曲的刚毛。螯足对称，长节呈棱柱形，具 3 条翅状脊，腕节及掌节的隆脊亦明显。步足扁平，第一对最长，向后诸对渐短，长节前缘具一隆脊，具大头棒状刚毛，其他各节的前、后缘均具大头棒状的刚毛。头胸甲长 18 毫米，宽 15 毫米。

栖居于水深 50—100 米的泥或沙底上。

分布于中国福建；朝鲜海峡；日本。

