


四齿磯蟹 蜘蛛蟹科 Maiidae

*Pugettia quadridens*(de Haan)

头胸甲表面密布短絨毛，并分布着大头棒形的刚毛，这在疣状突起、角状突起或球状突起上均較明显。肝区的边缘向前后各伸出一齿，与后眼窝齿以凹陷相隔，侧胃区具一系列斜行的弯曲刚毛，中胃区甚凸，具 2 个疣状突起，前、后排列，心、腸区亦甚隆，呈球状，但无疣状突起。額突起，向前伸出两根角状銳刺，内緣具长刚毛，背面复以弯曲的刚毛。螯足对称，雄此雌大，长节近长方形，背内緣具 4 个負刚毛的疣状突起，外緣具 2 个，腹外緣 3 个，腕节隆起，掌节的长度大于高度，内、外面隆起，指节較掌节略短。步足常具軟毛，間有若干刚毛，第一对最长，向后諸对渐短，长节背面平滑，腕节背面具一凹陷，前节及指节均为圓柱形，前节长，腹面中間及末端共具刚毛两簇，指节腹面具刷状刚毛，末端角質，銳而无毛，向下弯曲。头胸甲长 13.8 毫米，寬 10.2 毫米。

生活于低潮线，有水草、泥沙的水底，有时潛伏在具海藻、泥沙岸边的岩石縫中。

分布于中国的辽东湾、渤海湾，由山东半島一直延至南海；日本亦有。



单角名城蟹 蜘蛛蟹科 Maiidae

*Menaethius monoceros*(Latreille)

头胸甲呈长三角形，表面扁平，胃、心区及腸区均稍隆起，前者具 3 疣，后两者各具一疣。肝区边缘具 2 齿状突出，前齿較后齿为大。鰓区侧緣也具 2 齿，前齿較后齿为小，表面有 1—2 个突起。后緣的左右两端亦各具一突起。雄性額部較长，向前伸，唯稍向下弯，末端分 2 小齿，雌性額部常較短。眼窝小，眼柄常伸出。前眼窝角突出，呈銳三角形，后眼窝角稍隆不显著。第二触角基节的基部寬，鞭部細长，超越額角的末端。第三顎足长节的外末角突出。雄性螯足壮大，长节背緣近基部处具数疣，末端具 3 枚不显著的鈍齿，掌节侧扁，上、下緣均鈍圆。两指間在基部处空隙較大，可动指内緣基部具一壮齿。步足长节的前緣具数个带毛的疣，指节后緣均具小刺。雄性腹部分 7 节；雌性腹部分 5 节。头胸甲长 17 毫米，寬 13 毫米。

生活于低潮线的水草間或岩石旁。

分布于中国广东(海南島)、台湾；日本；泰国；夏威夷；印度；紅海；非洲东岸；广泛分布于印度本平洋区。