


动指近基部处具一齿。步足具黄色细长刚毛，各长节背缘的末端具一锐刺。两性腹部均分 7 节。头胸甲长 92 毫米，宽 75 毫米，额角长 26 毫米。

生活于水深 50—150 米的泥质或杂有贝壳的海底上。

分布于中国台湾；日本。




粗甲干枯蟹 蜘蛛蟹科 Maiidae

*Schizophrys aspera*(H. Milne-Edwards)

头胸甲除额部及眼窝外，近圆形，表面不甚隆，密布小颗粒，其中有許多尖锐的刺状突起，肝区多为尖锐的小刺，颊区具粗糙的颗粒。额突出，伸出两刺，稍向内弯，外缘基部各有一刺，两额刺中间有一三角形短刺。眼窝前、后各有 2 短刺，下眼窝齿小且锐。前侧缘具 6 刺，肝区一个，其余均在鳃区，末两齿较小。螯足很长，对称，长节及腕节均复以尖锐的小刺，掌节光滑，仅在背缘基部具 1—2 小刺，雄性两指间的空隙很大，不动指的末端呈匙状，可动指向内弯曲，内缘近中部具一较大的钝齿，近末端处具一小齿。步足密复短绒毛，长节背缘的末端具一小齿。两性腹部均分 7 节。头胸甲长 48 毫米，宽 42 毫米，额角长 18 毫米。

多栖息于沿岸带的海底岩石间。

分布于中国广东；日本；东非；广泛分布于印度太平洋的热带区。



长足长跨蟹 蜘蛛蟹科 Maiidae

*Phalangipus longipes*(Linné)

头胸甲的长度大于宽度，分区明显，表面复以短毛，胃区、鳃区及额部均有卷曲的刚毛。中胃区具 4 颗突起，前胃区一个较大，后胃区 3 个，心区一个，肠区具一个很高的突起，指向后方，两边各具一小突起，肝区 3 个，前鳃区 2 个较大，中鳃区 5 个，后鳃 2 个，颊区具一大锐齿，其基部具一小齿，在雌体有时不明显。额大，呈三角形，表面稍隆，中具一沟，前端分 2 齿，侧缘基部各具 2 锐齿。螯足，雄此雌大，长节呈圆柱形，末端具一小刺，腕节短，掌节长，指节短而内弯，内缘具细齿，雄体的可动指较不动指为窄，内缘基部具一大齿。