


福建余氏蟹 长脚蟹科 Goneplacidae

*Ser fukiensis* Rathbun

头胸甲的宽度大于长度，近矩形，表面密盖短绒毛，前半部向前下方倾斜，后半部稍隆，当袒裸时光滑，分区可辨。额部有一纵沟向后分开，胃、心区之间的沟甚为明显。额分两叶，各叶边缘稍拱。眼窝小，外眼窝角不明显。口框前宽后窄，第三颚足长节的宽度大于长度。前侧缘较锋锐，具3齿，第一齿钝，第二至第三齿锐，唯第三齿最小。后侧缘较前侧缘为长，左右几乎平行。螯足粗壮，不对称，密盖短绒毛，腕、掌节间具长刚毛，长节的背缘近末端处具一齿，腕节的内末角具一壮齿，掌节较高，两指呈黑色，内缘具大小不等的钝齿。第三对步足最长，指节瘦长，末对步指的指节向后弯曲。雄性腹部分7节，第二节的宽度约当第一节宽度的3/5，第三节的两端抵达末对步足的基部，末缘骤窄，其余4节呈窄条状，雌性腹部近长卵形。头胸甲长17毫米，宽23.3毫米。

生活于泥滩上。

分布于中国福建(刘五店、三都澳)。



隆线强蟹 长脚蟹科 Goneplacidae

*Euacrate crenata* de Haan

头胸甲近圆方形，前部较后半都稍宽，表面隆起，光滑，具红色小斑点，又有东田小颗粒，在前侧部较中部为明显。额分为明显的两叶，前缘横切，中有缺刻。眼窝大，内眼窝齿锐向下弯，不若额的突出，外眼窝齿呈钝三角形。前侧缘较后侧缘为短，稍拱，具3齿，中齿最突，末齿最小。螯足光滑，不甚对称，右螯大于左螯，长节光滑，腕节隆起，背面末部具一丛绒毛，掌节有斑点，指节较掌节为长，两指间的空隙大。步足多少光滑，第一对至第三对，依次渐长，而末对最短，长节前缘多少具颗粒，负短毛，其他各节亦具短毛。腹部，雄性呈锐三角形，雌性呈宽三角形。头胸甲长25毫米，宽31.2毫米。

生活于水深30—100米的泥沙质海底上，在低潮时的石块下亦有隐伏。黄姑鱼好捕食此蟹。

分布于中国广东、福建、山东半岛、渤海；朝鲜海峡；日本；泰国；印度；红海。