





麦克长眼柄蟹 长脚蟹科 Goneplacidae

Ommatocarcinus macgillivrayi White

头胸甲的前半部较后半部为宽，尤以眼窝外角之间为最宽，表面具 2 条横行的光滑隆脊，胃、心区具“H”形凹痕。额窄而弯向前下方，末部较宽，前缘中部自背面观略为凹陷，两侧缘在眼柄基部处紧束，眼窝宽，背缘稍拱而向侧方略为倾斜，具微细锯齿，眼窝外角锐而突，稍指向后侧方。眼柄很长。两侧缘在眼窝外角后无齿，向后靠攏，后缘几乎平直。螯足瘦长，不甚对称，长节呈三棱形，边缘钝而具细颗粒，腕节短而圆，内末角具一齿突，掌节扁平，末部较宽，其长度与长节的长度约相等，小螯两指内缘具锯齿，大螯两指间具空隙，可动指内缘基部具一较大钝齿。步足长节的中部较宽，均呈纺锤形，指节细长，前、后缘均具短毛。雄性腹部呈三角形，分 7 节。头胸甲长 13 毫米，宽 27.6 毫米。

生活于水深 100—150 米处的沙质或具贝壳的海底上。

分布于中国广东(海南岛)；日本；澳大利亚；新西兰。




裸盲蟹 长脚蟹科 Goneplacidae

Typhlocarcinus nudus Stimpson

头胸甲的宽度大于长度，呈长方形，表面隆起而光滑。额的前缘中部内凹，分成两叶，表面具一细纵沟，其后端与胃、心区上的箭头形印迹相连。两外眼窝角之间的距离约当头胸甲宽度的 $2/5$ ，眼窝小，眼柄短。口框的宽度由后向前趋窄。第三颚足长节呈四方形，外末角钝圆。前侧缘呈弧形，具 2 浅凹，并饰有长毛。两后侧缘近于平行。后缘平直。螯足的掌节光滑，仅背、腹缘具颗粒。步足瘦长，边缘具长毛，尤以在第四对步足各节的前、后缘上为稠密，指节向上弯，末端稍向后弯。雄性腹部呈窄三角形。雌腹腹部呈长卵圆形。头胸甲长 8.3 毫米，宽 11.0 毫米。

生活于水深 30—50 米处泥沙质海底上。

分布于中国广东、胶州湾；泰国；新加坡；印度洋。




毛盲蟹 长脚蟹科 Goneplacidae

Typhlocarcinus villosus Stimpson

头胸甲的宽度大于长度，呈长方形，表面隆起，具绒毛及颗粒。额窄，前缘中部被一浅缺刻分为两叶，各叶前缘钝圆。眼窝近卵圆形。口框呈纵长方形，第三对颚足长节的外末角钝圆。前侧缘被两个浅缺刻分为3小叶，各叶的边缘呈弧形。后侧缘近于平直，前、后侧缘均具短毛及颗粒。螯足不对称，大螯腕节的末缘、掌节的外侧面及可动指均具绒毛。小螯腕节的内、外侧面亦具绒毛。两指除内缘及末半部外亦具绒毛。步足各节的前、后缘均具短毛，第一对与第四对步足的长度相近，第二与第三对的长度相近。第四对步足的指节直。头胸甲长6.5毫米，宽9毫米。

生活于水深30—60米的泥沙底上。

分布于中国广东；日本；暹罗湾；新加坡；印度洋。



穆氏拟短眼蟹 长脚蟹科 Goneplacidae

Xenophthalmodes moebii Richters

头胸甲的宽度略大于长度，背面自前至后很隆起，盖有稀疏的短绒毛，唯接近后侧缘附近具少数细颗粒。分区不全，唯心区两侧各具一不甚明显的新月状浅沟。额窄，分为两圆叶，眼窝呈卵圆形，眼无色素。前侧缘呈弧形，后侧缘较直，向后略为分展，因此头胸甲的最宽处，介于第三对步足基部之间。后缘广宽而稍突。口框前窄后宽，第三颚足长节的外末角钝圆。螯足腕节的内末角尖锐，掌节左右不等大，高而侧扁，背缘薄而呈脊状，腹缘具细颗粒。步足各节的前后缘上密具丝状细刚毛，指节尖锐，略向内弯。雌性头胸甲长8.8毫米，宽10.3毫米。

生活于水深30—50米的沙泥质或泥质，杂有贝壳的浅海底上。

分布于我国南海；日本太平洋沿岸；印度洋；波斯湾。