


毛盲蟹 长脚蟹科 Goneplacidae

*Typhlocarcinus villosus* Stimpson

头胸甲的宽度大于长度，呈长方形，表面隆起，具绒毛及颗粒。额窄，前缘中部被一浅缺刻分为两叶，各叶前缘钝圆。眼窝近卵圆形。口框呈纵长方形，第三对颚足长节的外末角钝圆。前侧缘被两个浅缺刻分为3小叶，各叶的边缘呈弧形。后侧缘近于平直，前、后侧缘均具短毛及颗粒。螯足不对称，大螯腕节的末缘、掌节的外侧面及可动指均具绒毛。小螯腕节的内、外侧面亦具绒毛。两指除内缘及末半部外亦具绒毛。步足各节的前、后缘均具短毛，第一对与第四对步足的长度相近，第二与第三对的长度相近。第四对步指的指节直。头胸甲长6.5毫米，宽9毫米。

生活于水深30—60米的泥沙底上。

分布于中国广东；日本；暹罗湾；新加坡；印度洋。



穆氏拟短眼蟹 长脚蟹科 Goneplacidae

*Xenophthalmodes moebii* Richters

头胸甲的宽度略大于长度，背面自前至后很隆起，盖有稀疏的短绒毛，唯接近后侧缘附近具少数细颗粒。分区不全，唯心区两侧各具一不甚明显的新月状浅沟。额窄，分为两圆叶，眼窝呈卵圆形，眼无色素。前侧缘呈弧形，后侧缘较直，向后略为分展，因此头胸甲的最宽处，介于第三对步足基部之间。后缘广宽而稍突。口框前窄后宽，第三颚足长节的外末角钝圆。螯足腕节的内末角尖锐，掌节左右不等大，高而侧扁，背缘薄而呈脊状，腹缘具细颗粒。步足各节的前后缘上密具丝状细刚毛，指节尖锐，略向内弯。雌性头胸甲长8.8毫米，宽10.3毫米。

生活于水深30—50米的沙泥质或泥质，杂有贝壳的浅海底上。

分布于我国南海；日本太平洋沿岸；印度洋；波斯湾。