




紅樹拟蟹守螺 汇螺科

*Cerithidea rhizophorarum* A. Adams

貝壳呈长錐形，壳質稍薄，壳頂数层常被腐蝕，残留部分高 33 毫米，寬 15 毫米。残留的螺层約 8 层，縫合綫淺。各螺层寬度增加均匀，螺旋部高，体螺层短而稍寬。壳面微显膨胀，具有纵横交叉的肋，近壳頂数层纵肋較发达，下部数层螺肋較发达，二种肋交叉形成明显的顆粒突起。在每一螺层的縫合綫下方的第一螺肋最粗大。在体螺层的腹面左侧有一个纵肿突起。壳面顏色稍有变化，通常每一螺层的上半部为黄白色，下半部为紫褐色；亦有全壳呈黑色者。貝壳基部略膨脹，生有細小的螺肋多条。壳口卵圓形，內面有細沟紋和棕色色带。外唇上部多少反折，下部微向前部延伸；內唇上部稍扩张。后沟不明显，前沟淺，呈竇状。

生活在潮間帶上区有淡水注入的泥沙質的海滩上，常常生活在有紅树丛林的环境中。見于我国南海。日本；菲律宾也均有分布。



彩拟蟹守螺 汇螺科

*Cerithidea ornata* (A. Adams)

貝壳錐形，壳質稍薄。壳頂數層常被磨損，殘留部分高 34 毫米，寬 15 毫米。殘余螺層約有 8 層，各螺層寬度增加均勻，體螺層較短，稍膨脹；縫合纜深，在縫合綫中間有一細弱的綫狀螺紋，此螺紋在體螺層上方的縫合綫處不顯。壳面微顯膨脹，具有發達的縱肋，上部各螺層的縱肋較細，排列亦較密，下部各螺層的則較粗，排列亦較稀。下部兩螺層左腹方各有縱腫脈一條。壳表黃白色，每一螺層具有棕色色帶兩條，上面的較窄而色淺，下面的較寬而色深。貝壳基部稍膨脹，近壳軸基部有不明顯的螺肋數條。壳口卵圓形，內面有棕色帶三條，外唇稍厚，多少反折；內唇微有扭曲，后溝不顯，前溝淺呈竇狀。

生活在潮間帶上區多少有淡水注入的內灣的泥沙灘上。見于我國南海。日本；菲律賓也有分布。