


身体椭圆形，长 50 毫米，宽 35 毫米。壳片蓝绿色，杂有褐色和其它色彩的斑点，环带杏黄色，颜色美丽。头板半圆形，有网状刻纹和十条强大的放射肋。中间板的中央部有细的纵肋，肋间沟呈绳纹状，中央部和翼部分界明显，翼部具有“之”字形的细肋。尾板明显的分为两部，中央区大，后区小，在后端有一凹陷。两侧环带特别宽大，其上有密布的小刺和鬃毛状长刺。长刺上有纵的浅沟，沟内着生小刺。

分布于中国山东半岛以北的黄海沿岸，自潮间带至数十米深处都曾发现。苏联远东海和日本也有分布。




网纹鬃毛石鳖 鬃毛石鳖科

*Mopalia retifera* Thiele

身体椭圆形，体长 15 毫米，宽 9 毫米。壳片灰白色，杂有红色、绿色和褐色的斑点，有些个体完全为翡翠绿色，环带土黄色。头板半圆形，具有网状刻纹和 10 条颗粒的放射肋。中间板的中央部有网状刻纹，翼部有 2 条粗大的、具有粒状突起的肋。尾板自壳顶向两侧各有一条突出的肋，将尾板分为两个不等的部分，中央区较大，后区较小。尾板的后端有一明显的缺刻。环带周缘有一列大小均匀、较长的刺，环带表面被有很多小型的刺和大型的鬃毛状刺，并在其上着生有石灰质小刺。

分布于我国福建东山以北的沿海，生活在潮间带。日本太平洋沿岸和日本海也有分布。



日本宽板石鳖 鬃毛石鳖科

*Placiphorella japonica* (Dall)

身体近圆形，体长 40 毫米，宽 30 毫米。颜色常因不同的个体和生活环境有很大的差异，一般有红色，黑色或褐色的花纹。壳板短而宽，较扁平，头板新月形，有细密的生长纹，中间板的翼部较中央部略高，尾壳顶靠后端，因此尾板中央区很大。环带前缘特别宽，向后逐渐变窄，上面布有粗短的棒状棘，棘的表面刻有网纹。鳃 22—24 对，鳃列长度超过足长的 2/3。

见于我国东南沿海潮间带的低潮区，附着于岩礁上生活。日本也有分布。