


沟纹筍光螺 汇螺科

*Terebralia sulcata* Born)

貝壳中等大，呈錐形，壳質重厚結实，壳頂常被磨損，高 50 毫米，寬 29 毫米。螺层約 9 层，各螺层寬度增加均匀。縫合綫浅，呈綫状，有的中間还可看到有一条微細的螺紋。壳面生有寬而低平的螺肋，肋間距离甚小，呈細沟状，縱肋較低而寬，排列較稀。在腹面基部左側略肿胀形成一較弱的縱肿脉。在壳頂数螺层，壳面肋紋常被磨損不見；在体螺层肋不发达。壳色灰白，具紅褐色色帶，貝壳基部膨胀，下部收窄，生有螺肋多条。壳口寬广，呈梨形，內面淡褐色，染有深褐色色帶，富有光泽。外唇极厚，向外扩展並反折，其前端向腹面左方延伸与体螺层左腹面联結；內唇薄。后沟較明显，前沟系由外唇与体螺层联結構成一圓孔。

暖海产，生活在潮間带、高潮区有淡水注入的海湾或紅树丛林的泥沙質海滩，分布于我国海南島的三亚。日本；菲律宾等地也均有分布。




纵带滩栖螺 汇螺科

*Batillaria zonalis* (Bruguère)

北方俗名尖锥螺，贝壳较小，结实，呈尖锥形，壳高 30 毫米，宽 10 毫米。螺层约 12 层，缝合线明显，但在壳顶数层模糊不清。壳顶部常被磨损，螺旋部高，各螺层宽度增加均匀，体螺层较短小，微向腹方弯曲。每一螺层表面具有较粗的波状纵肋及细小的螺肋，在体螺层下部的纵肋多不显。壳色有变化，通常为灰黄或黑褐色，在每一螺层的下部，缝合线的上方有一环灰白色的色带。贝壳基部膨胀，下部收窄，密生细小的螺肋。壳口卵圆形，内有褐色条纹。外唇弧形，简单，内唇稍厚。前沟呈竇状，后沟不显仅留缺刻。

生活在潮间带高潮区的泥沙滩，全国沿海都有分布，为习见的种类。澳洲、日本等地也均有其踪迹。我国沿海居民将其煮熟而食其肉，如食瓜子。但经济价值不算高。



古氏滩栖螺 汇螺科