





胆形织纹螺 织纹螺科

*Nassarius thersites* (Bruguère)

贝壳粗短，呈胆囊状，壳质坚厚，高 21 毫米，宽 13 毫米。螺层约 7 层，缝合线明显，呈波状。螺旋部短小，体螺层膨大。壳面刻有明显的纵肋和粗的螺纹，纵肋在体螺层近壳口部逐渐变弱或消失，螺纹在体螺层的基部有 5—6 条非常明显。壳表灰绿色，在体螺层上有 2 条宽的紫褐色色带。壳口较小，梨形，内面深褐色具有一条黄白色色带。前沟短，很深，后沟为一小的缺刻。外唇上部甚厚，下半部较薄，内缘具数个小齿。内唇甚发达，贴在体螺层上扩张成为淡黄色滑唇，其上缘达次体螺层，在滑唇中部有一纵列小的齿状突起。

生活在潮间带沙滩上，是东海和南海习见的织纹螺之一。日本，菲律宾也有分布。




纵肋织纹螺 织纹螺科

*Massarius variciferus* (A. Adams)

贝壳呈长尖锥形，壳高 26 毫米，宽 12 毫米。螺层约 9 层，缝合线深，呈沟状，不整齐。螺旋部高，各螺层的壳面不膨胀，均刻有细高的纵肋和细密的螺纹。纵肋上端较粗大，形成一系列类似结节的突起。螺纹在各肋间比较明显，在体螺层基部者较发达。通常在每一螺层上还生有一、二条粗大的纵肿脉。壳表淡黄色，混杂有不明显的褐色云斑。壳口卵圆形，内面淡黄色，前沟短，稍深，后沟为一小的缺刻。外唇边缘有厚的镶边，外缘不整齐，有细齿状缺刻，内缘通常有 6 个齿状突起。内唇薄，稍扩张，紧贴于体螺层及壳轴上。

生活在潮间带及潮下带的泥沙质海底，习见种，分布于我国沿海。日本也有分布。



红带织纹螺 织纹螺科

*Nassarius succinctus* (A. Adams)

贝壳略呈纺锤形，壳质较坚硬，高 19 毫米，宽 9 毫米。螺层约 9 层，缝合线明显。螺旋部较高，体螺层中部膨胀，基部收窄。除胚壳外，近壳顶数螺层均刻有明显的纵肋和极细的螺肋。在其他螺层上纵肋和螺肋不明显，壳面较光滑，通常只在缝合线紧下方有一条和体螺层的基部有十余条螺旋形沟纹。壳表黄白色，体螺层有 3 条红褐色色带，其余各螺层有 2 条。壳口卵圆形，内面黄白色，同样具有 3 条红褐色色带，并刻有 6、7 条肋纹。前后各有一个深沟，前者宽短呈“U”形，外唇背侧有一强的黄白色唇脊，缘的下方生有细齿；内唇弧形，其上缘贴覆在体螺层上，边缘有细的小齿。具角质厣。

生活在浅海数十米水深的泥沙质海底，我国沿海均有分布，为习见的种类。日本和菲律宾也有分布。