

管吻鲀

三刺鲀科

Halimochirurgus alcocki Weber

背鳍 II, 13—14; 臀鳍 11—12; 胸鳍 12; 腹鳍 I-0—1; 尾鳍 10(分枝)。鳃耙 4—19。

体长 133—153 毫米。体长梭状, 侧扁; 体长为体高 5.3—5.4 倍, 为头长 1.6—1.7 倍。头很细长, 略侧扁; 头长为吻长 1.2—1.3 倍, 为眼径 6—6.1 倍。吻呈长管状, 稍侧扁, 前端稍膨大向上弯曲。眼大, 圆凸, 侧位稍高。眼间隔宽为 1/2 眼径, 中央微凹。前后鼻孔位眼前缘附近。口小, 上位, 口宽为眼径 1/3。上下颌各有一行尖锥状牙。鳃膜骨 6。鳃孔侧位而稍低, 为直立短缝状。除口唇外, 头体均被小鳞, 鳞面有一行 6—8 个绒状毛刺。无侧线。第一背鳍位胸鳍基稍后方, 鳍棘强大, 略伸不到第二背鳍; 第二背鳍始于肛门前上缘, 圆形, 与臀鳍约对称。胸鳍位鳃孔正后方, 圆形, 微长于背鳍条。腹鳍胸位, 鳍棘似前背鳍;

有或无一痕状鳍条。尾鳍圆矛状。体红色, 在二背鳍下方及眼后, 有二红褐色纵纹, 尾柄背侧有一横褐斑。腹膜黑褐色。

为热带深水底层珍奇海鱼。曾在珠江口外水深 309—393 米处捕到。

分布于菲律宾, 日本(高知冲), 中国(珠江口外)。




图 569 管吻鲀

宽尾鳞鲀

鳞鲀科

Abalistes stellaris Bloch et Schneider

背鳍 III, 26—28; 臀鳍 24—25; 胸鳍 15; 尾鳍分枝鳍条 10。纵列鳞 42—44。鳃耙外行 3+29, 内行 0+22。

体长 62—256 毫米。头体长椭圆形, 侧扁。体长为体高 1.7—2.3 倍, 为头长 2.5—2.9 倍。尾柄细锥状, 向后渐平扁。头大, 上下缘略凸; 头长为吻长 1.5—1.8 倍, 为眼径 3.4—4.2 倍。吻很大, 眼前有一纵凹沟。眼位很高且后。眼间隔宽。二鼻孔位眼稍前方。口小, 前位。牙楔状, 上颌二行, 下颌一行。唇厚。鳃孔侧中位, 直立短缝状。头体均被鳞, 鳞面有小突起; 鳃孔后有数个大骨板状鳞; 尾侧有数行鳞成纵棱状。侧线细弱。背鳍分离; 第一背鳍始于鳃孔上方, 第一鳍棘很粗长, 约等于头长 7—8/10; 第二背鳍始于肛门上方, 不达尾鳍, 约与臀鳍对称。胸鳍短圆, 位稍低。腹鳍为一短棘突, 能活动, 附腰带骨末端。尾鳍凹截形, 鱼愈大上下缘愈尖长。体色多变化; 背侧灰褐而微绿, 有 3 个淡蓝绿色大斑及许多小圆斑; 头

侧中部及臀鳍基上方有数条淡蓝绿色纵纹; 腹侧淡黄。第一背鳍淡红而有数黑斑; 其它鳍橙黄色, 背臀鳍有 5—7 条黑纵纹, 胸鳍与尾鳍后缘蓝白色。

为热带底层海鱼。内脏等有弱毒, 盐腌后肉可食。

分布于东非到夏威夷, 澳大利亚到日本。中国广东习见。




图 570 宽尾鳞鲀