

龙头鱼 狗母鱼科

Harpodon nehereus (Hamilton)

[水潺、殿鱼、九吐(广东),龙头鱼(温州)]

背鳍 11—12; 臀鳍 14—15; 胸鳍 10—12; 腹鳍 9。侧线鳞 40—44。

体长 161—231 毫米。体长为体高 5.7—7 倍; 为头长 4.4—5.2 倍。体柔软, 吻短而钝。眼很小,




图 115 龙头鱼

口很大。两颌和腭骨均密生细尖的牙。鳃盖条 23—26。身体大部无鳞。背鳍起点和腹鳍起点相对。臀鳍位于脂鳍的下方。尾鳍 3 叉形。身体乳白色, 背鳍、胸鳍和腹鳍灰黑色或白色, 臀鳍白色, 尾鳍灰黑色。

一般体长约 190 毫米, 长者达 400 毫米。生活于浅海泥底的海湾中, 浙江乐清湾产量较大。用定置网捕捞。鲜销或晒为干品。

分布于南海和东海中国海域; 印度尼西亚。

七星底灯鱼 灯笼鱼科

Benthosema pterota (Alcock)

[七星鱼(浙江)]

背鳍 11; 臀鳍 17—18; 胸鳍 12; 腹鳍 8。

体长 28—37 毫米。体长为体高 4—4.1 倍; 为头长 3.1—3.4 倍。吻短。眼大。两颌等长。上




图 116 七星底灯鱼

颌骨末端伸到前鳃盖后下缘。两颌、犁骨、腭骨和舌上有牙。鳃耙 8+14。体被圆鳞, 极易脱落。侧线完全。尾柄上方有 1 小脂鳍。体银灰色。头和体皆有许多圆形发光器。

为寸许长的经济鱼类, 每年秋末冬初盛产于东海。鱼群习惯在夜间上浮水面。用张网捕捞。通常制为干品出售, 亦是制作鱼露的原料。

分布于中国东海, 菲律宾; 日本。