

鲸 鲨 鲸鲨科

Rhincodon typus Smith

体庞大，前部平扁，自第一背鳍以后渐细小。头宽扁，约为全长五分之一；尾细小，比头和躯干为短，尾基上方有一凹洼，尾柄两侧各具一侧褶。背面正中自头后至第一背鳍具一皮嵴；体侧自第一鳃孔前面上方始具2皮嵴，上皮嵴后延到第一背鳍近处分为两枝，伸达第二背鳍下方，下皮嵴在鳃孔区上方弧形弯下，伸达尾柄。吻宽而短，钝圆带截形；眼小，圆形，无瞬膜，眼间隔很宽；鼻孔宽大，位于吻端两侧，出水孔开口于口内。口巨大，端位；上唇褶发达，伸达鼻孔，下唇褶短小，见于口隅处；牙多而细小，圆锥形，齿头后斜，多行使用，每颌约340余纵行。喷水孔椭圆形，比眼为小，位于眼后角上方。鳃孔5个，很宽大，最后2个位于胸鳍基底上方；鳃弓具许多鳃耙，分成许多小枝，交叉结成海绵状过滤器。

背鳍2个，无硬棘；第一背鳍位于体腔后部上方，其基底后部与腹鳍基底相对；第二背鳍小，起点稍前于臀鳍起点；尾鳍叉形，尾椎轴上翘；臀鳍

很小，基底与第二背鳍基底后半部相对；腹鳍约与臀鳍等大；胸鳍宽大，稍呈镰刀形。

体灰褐、赤褐或青褐色，具许多黄色斑点及横条。大洋性上层鱼类，有时也来近海索饵，好群游，常在水面上晒日或徐游摄取浮游生物为食，也吞食小型鱼类。进行远程洄游，在我国沿海夏秋北上，冬春南返。体长普通10米左右，最大者可达20米。

广泛分布于印度洋，太平洋和大西洋热带和温带各海区。




图13 鲸鲨

欧氏锥齿鲨 锥齿鲨科

Carcharias owstoni Garman

(沙鲛、白生)

体延长而粗大，头宽扁，三角形，向前狭小低平；尾侧扁，比头和躯干稍短，尾鳍基底上方具一凹洼。吻长而尖突，比眼径约大5倍，眼小，卵圆形，无瞬膜；鼻孔平横，前鼻瓣具一三角形突出，鼻间隔约为鼻孔宽之2倍。口深弧形，下颌较短，牙暴露；下唇褶粗宽，几为下颌长三分之一，上唇褶细弱，在于上唇的里侧，口闭时不见。牙大小不匀，在前面者狭长斜曲，在侧面者短而较宽，在后面者低小不发达；上下颌都无正中牙，上颌每侧第一牙比第二牙稍小，第三牙最大，第四牙很小，第四与第五牙之间有一空隙；下颌每侧第一牙较细小，第二和第三牙最大；一般上颌第四牙和第七牙以后各牙都无侧齿头，下颌第一牙和第七牙以后也无侧齿头。喷水孔微小，位于眼后角水平线上，与眼的距离约等于眼径的3倍。鳃孔5个，宽大，最后一个位于胸鳍基底前方。

背鳍2个；第一背鳍稍大，起点与胸鳍后端相

对，基底后端前于腹鳍起点；第二背鳍起点后于腹鳍基底后端，下角较延长尖突；尾鳍宽长，尾椎轴上翘，下叶前部显著圆形突出，后部有一缺刻；臀鳍比第二背鳍稍小，起点稍前于第二背鳍基底后端下方；腹鳍比第二背鳍稍大，位于两背鳍中间下方，略呈方形；胸鳍大，宽与长几相等。

体灰褐色和黄褐色，背侧面和鳍上具不规则锈色斑点，鳍缘黑色，腹面淡色，有时也呈灰褐色。底层或近底层栖息，行动滞缓，性凶猛，食小黄鱼、竹荚鱼、鳐类及乌贼等。卵胎生。体长达2米以上。

分布于黄海和东海中国海域；日本，朝鲜。




图14 欧氏锥齿鲨