

乳突天竺鲷

天竺鲷科

Papillapogon auritus (Cuvier et Valenciennes)

背鳍 XII, I-9; 臀鳍 II-8; 胸鳍 12; 腹鳍 I-5;
尾鳍 17。侧线鳞 19—20, 1/3-4。

体长 40—43 毫米。体长为体高 2.9—3 倍，
为头长 2.4—2.6 倍。头较大，头长大于体高，头
长为吻长 4.3—4.6 倍，为眼径 3.4—3.7 倍。在
吻端靠近上颌有二乳头状突起。眼大，眼间隔小
于眼径。口中等大。两颌具细绒毛齿。犁骨与腭
骨亦具绒毛齿。前鳃盖骨边缘平滑。第一鳃弓上
鳃耙细短，鳃耙数 2+5。体被弱栉鳞，鳞片易脱落。
背鳍 2，稍分离。第一背鳍起点距吻端较距尾鳍
基为近，第二背鳍与臀鳍相对。胸鳍末端达臀鳍
起点前。腹鳍位于胸鳍下方。尾鳍圆形。体棕灰
色，体侧及各鳍上散布有黑色斑点。鳃盖上有一

黑色圆斑。

为热带种类，生活于近岸珊瑚礁中。

分布于红海，印度，印度尼西亚，中国，菲律
宾，大洋洲。在我国产于南海的西沙群岛与海南
岛一带。




图 353 乳突天竺鲷

巨牙天竺鲷

天竺鲷科

Cheilodipterus macrodon (Lacépède)

背鳍 VI, I-9; 臀鳍 II-8; 胸鳍 13; 腹鳍 I-5;
尾鳍 17。侧线鳞 26, 3/6。

体长 140 毫米。体长为体高 3.6 倍，为头长
2.4 倍。头大，背部平坦，头长为吻长 4.1 倍，为眼
径 3.9 倍。眼大，眼间隔平坦，其宽约为眼径的
2/3。口大。两颌具发达犬牙，下颌前端有二大犬
牙，两侧有等大犬牙 6 个。上颌前端犬牙较小，两
侧有犬牙 4 个。两颌基部及犁骨、腭骨具绒毛齿。
前鳃盖骨边缘有细锯齿。第一鳃弓上鳃耙短小，
鳃耙数 5+9。栉鳞中等大，排列整齐。背鳍 2，
相距近。第一背鳍起点距第二背鳍基底末较距吻
端为近。第二背鳍与臀鳍相对。胸鳍位底，末端达
肛门上方。腹鳍位于胸鳍后下方。尾鳍分叉。体
棕色微紫，体侧有 8 条纵条，在侧线上方 3 条，侧

线下方 5 条。第一背鳍紫色，其他各鳍棕黄色。

为大型天竺鲷，体长达 200 毫米左右。属于
热带种类。

分布于红海，非洲东岸，印度，印度尼西亚，中
国。在我国主要产于南海的海南岛一带。




图 354 巨牙天竺鲷