

云 鲷 锦 鲷 科

Enedrias nebulosus (Temminck et Schlegel)

背鳍 LXXVIII; 臀鳍 II-36—39; 胸鳍 15—16; 腹鳍 I-1; 尾鳍 20。鳃耙 3+11。

体长 122.5—174 毫米。体长形，短带状；体长为体高 6.8—8.4 倍，为头长 8.1—8.9 倍。头短小，亦侧扁；背侧低棱嵴状；头长为吻长 5—5.8 倍，为眼径 4.8—6.1 倍。吻短。眼很小，侧位而高，眼后距为 2/3 头长。眼间隔窄。鼻孔有短管状皮突起。口较小，前位且很低，斜形，不达眼下；下颌较上颌略长。上下颌有粗短牙群。犁骨牙数少。鳃孔大，位体下半侧。鳃盖膜互连，与峡部分离。鳃膜骨 5。有假鳃。鳃耙尖短。躯干部椎骨横突连成脉弧。自眼向后有很小圆鳞。无侧线。背鳍始于鳃孔背角上方，全由粗短鳍棘形成，后方与尾鳍基端相连。臀鳍约始于第 40 背鳍棘下方，与背鳍相似，亦与尾鳍相连。胸鳍短圆形，侧

位而稍低，头长为其长 2.2—2.6 倍。腹鳍位胸鳍基前下方，很短小。尾鳍短圆形。背侧淡黄灰褐色，向下渐为淡黄白色；背面及体侧均有花云状淡黑斑。自眼间隔到眼下有一黑纹。各鳍淡黄色；背鳍与臀鳍亦具云状暗斑。

为浅海小杂鱼。

分布于苏联萨哈林岛（即库页岛），日本，朝鲜，中国黄、渤海区。



图 469 云鯥

六 线 鲷 线 鲷 科

Ernogrammus hexagrammus (Temminck et Schlegel)

背鳍 XXXIX; 臀鳍 I-26; 胸鳍 14; 腹鳍 I-4; 尾鳍 18 (12 分枝)。鳃耙 8—9。

体长 46.9—99 毫米。体长形，前方微侧扁，向后渐甚侧扁；体长为体高 6—6.7 倍，为头长 3.7—4.3 倍。头长锥形，无骨棱和棘突；头长为吻长 3.8—5.1 倍，为眼径 4—4.4 倍。吻稍平扁。眼中等大，位头侧上方。眼间隔窄且微凹。后鼻孔有管状突起。口大，前位，斜形；下颌较上颌略长；上颌达瞳孔后缘下方。唇发达。上下颌、犁骨与腭骨均有牙。鳃孔大，侧位，达头腹侧。鳃盖膜互连，且连峡部。鳃耙很短小。除头及鳍膜外，体全被很小圆鳞。侧线 3 条，波纹状且有很多斜短叉，叉末端有小孔；上侧线自鳃孔背侧约达背鳍基后端；中侧线自胸鳍基上缘到尾鳍基；下侧线自腹鳍前方向后呈叉状，到臀鳍前上方又相合，

约止于臀鳍基后端。背鳍始于鳃孔后上方，全为鳍棘。臀鳍始于第 13 背鳍棘下方，与背鳍相似，均与尾鳍稍相连。胸鳍圆形，约等于 3/5 头长。腹鳍喉位，长等于胸鳍 1/2。尾鳍圆形。背侧棕黑色，有 9 个灰白斑；腹侧灰白色。头顶有 2 白色横宽纹。奇鳍灰黑色，偶鳍黄色，胸鳍有 6 条黑横纹。

为近海小杂鱼。

分布于中国，朝鲜，日本。见于渤、黄海及东海北部。




图 470 六线鯥