

## 鲹 金枪鱼科

*Katsuwonus pelamis* (Linnaeus)

背鳍 XV, 15, 小鳍 8; 臀鳍 15, 小鳍 8; 胸鳍 28; 腹鳍 I-5; 尾鳍 32—34。

体长 272—454 毫米。体长为体高 3.6—4.3 倍, 为头长 3.1—3.5 倍。体粗壮, 呈纺锤形, 尾柄细, 中央具一发达隆起嵴, 尾鳍基有 2 小隆起嵴。头大, 圆锥形, 头长为吻长 3.4—3.8 倍, 为眼径 5.2—6.5 倍。吻尖, 眼中等大, 侧上位, 靠近吻端。眼间隔宽。口较大, 上颌骨后端达瞳孔前下方, 两颌具细小圆锥齿一列。犁骨、腭骨及舌上均无牙。前鳃盖骨及鳃盖骨边缘圆滑。第一鳃弓上鳃耙细而密最长鳃耙约等于眼径, 鳃耙数 17 + 35—39。体除胸甲具较大鳞外, 其余均裸露无鳞, 胸甲襟鳞向后沿背部有数行小鳞达第二背鳍下。侧线完全。背鳍 2, 相距甚近。第一背鳍第 1—4 鳍棘最长, 约为头长之半。第二背鳍紧接第一背鳍之后, 与臀鳍相对, 其后各有小鳍 8 个。

胸鳍短, 略呈三角形。腹鳍小, 腹鳍间突分二瓣, 其长不达腹鳍之 1/2。尾鳍新月形。体背部蓝褐色, 腹部银白色, 在体侧下半部有 4—6 条褐色纵条带。

为大洋性上层洄游鱼类, 栖息水温为 20—30℃, 以小鱼、浮游甲壳类为食饵。

分布甚广, 热带及亚热带海洋中。在我国主要产于南海一带。




图 497 鲹

## 白卜真金枪鱼 金枪鱼科

*Euthynnus yaito* Kishinouye

(白卜)

背鳍 XIV—XV, 13, 小鳍 8; 臀鳍 14, 小鳍 7; 胸鳍 28; 腹鳍 I-5; 尾鳍 34。

体长 340—542 毫米。体长为体高 3.5—3.7 倍, 为头长 3.6—3.8 倍。体呈纺锤形, 横断面近圆形, 尾柄细, 中央有一隆起嵴, 尾鳍基 2 隆起嵴小。头较大, 圆锥形, 头长为吻长 2.9—3.6 倍, 为眼径 5.2—7.5 倍。吻尖。眼中等大, 眼间隔宽稍凸起。口中等大, 上颌骨后端达眼后缘下方。两颌齿一行, 细小而尖锐。犁骨与腭骨各具细齿一列。前鳃盖骨边缘平滑。第一鳃弓上鳃耙细密, 最长鳃耙稍短于眼径, 鳃耙数 7—9 + 22—25。体只胸甲部具鳞, 鳞片在胸鳍上方稍大。侧线完全, 微呈波纹状。背鳍 2, 互相分离, 两者距离约为眼径的 2 倍。第二背鳍与臀鳍同形, 其后各有小鳍 7—8 个。胸鳍位较高。腹鳍短于胸鳍, 腹鳍间突分二瓣, 约为腹鳍长 1/2。尾鳍强, 新月形。

体背部蓝黑色, 腹部银灰色。在胸部无鳞区有黑色圆斑 3—5 个。

为大洋性热带及亚热带种类。产量大, 具经济价值。

分布于印度洋及太平洋热带海区。在我国主要产于南海的海南岛外海, 渔期为 7—9 月。




图 498 白卜真金枪鱼