

## 东坡鱼 鲤科

*Garra pingi* (Tchang)

(墨鱼、猪嘴鱼、墨洛鱼)

背鳍 II-9—10；臀鳍 II-5；胸鳍 I-15—17；腹鳍 I-8。侧线鳞 45—49，6—6.5/3.5—4。鳃耙 38—44。咽齿 3 行，2.4.5-5.4.2。

体长 132—360 毫米。体长为体高 4.6—5.7 倍，为头长 4.1—5.2 倍。体长形，前部略呈圆筒状，腹部较平，尾柄侧扁。头宽而稍平扁，略呈方形。头长为吻长 1.5—2.1 倍，为眼径 4.3—6.4 倍。吻圆钝，吻皮向下向后盖过上颌，边缘为流苏状，在口角处与下唇相连。口大，下位，横裂。上唇消失；下唇向颐部发展成一椭圆形的大吸盘，中央为一肉质垫，周缘呈游离的薄片，有小乳突。成鱼无须。鳃耙短小而密。咽齿末端尖细。鳞中等大，胸部及腹部中线裸露。背鳍起点前于腹鳍，较近于吻端，外缘深凹，无硬刺。尾鳍深叉形。鳔 2 室。腹膜微黑。体浓黑褐色，背部色深，腹部灰白，

体侧鳞片基部各具黑点而连成断续纵纹，鳍灰黑色。

底栖性鱼类，通常栖息于急流中，以吸盘吸附于岩石面上。主食着生藻类和植物碎屑，有时也食少量昆虫幼虫。3—4 冬龄达性成熟。产卵期在 5—6 月。产卵于流水中。大的鱼可长至 1.2 市尺。味极鲜美，为珍贵的经济鱼类，但产量很少。

分布于岷江、雅砻江、金沙江、元江、澜沧江等水系。




图 145 东坡鱼

## 东方墨头鱼 鲤科

*Garra orientalis* Nichols

(墨鱼、狮子鱼)

背鳍 II-8；臀鳍 II-5；胸鳍 I-15；腹鳍 I-8。侧线鳞 30—32，4—4.5/3—3.5。鳃耙 17—21。咽齿 3 行，2.4.5-5.4.2。

体长 40—145 毫米。体长为体高 3.7—5 倍，为头长 3.9—4.7 倍。体长形，前部略呈圆筒状，腹部较平，尾部侧扁。头中等大，较宽，背面在鼻前有一深凹陷。头长为吻长 1.5—2.2 倍，为眼径 3.8—5.8 倍。吻皮盖于上颌，表面有细小乳突，边缘为流苏状，在口角处与下唇相连。口下位，横裂。上唇消失；下唇为一吸盘，中央为光滑的肉质垫，周缘为游离薄片。须 2 对。鳃耙短小。咽齿末端尖细。鳞中等大，胸部鳞片极小。背鳍起点前于腹鳍，较近于吻端，外缘略凹，无硬刺。尾鳍深叉形。鳔 2 室。腹膜灰色。体背棕黑，腹部灰白，体侧鳞片具黑点而连成纵纹，各鳍灰黑，胸、腹、臀鳍带桔红色。

为底栖鱼类，通常栖息于急流中，以吸盘吸附于岩石上。吸食着生于水底岩石上的固着藻类。成熟较早。产卵期约始自 5 月。产卵需有流水条件。为中小型鱼类，富含脂肪，肉味鲜美，为产区名贵鱼类。

分布于华南的珠江、韩江、闽江、元江等水系和海南岛。




图 146 东方墨头鱼